



Radiología



APROXIMACIÓN MULTIMODAL AL COMPLEJO AREOLA-PEZÓN: PICTORIAL Y ALGORITMO DIAGNÓSTICO

M. Pitarch Diago¹, C. Codina Aróztegui¹, J. del Riego Ferrari¹, L. Nebot Muro², F.J. Andreu Navarro² y A. Medina Argemi³

¹Udiat-CD; ²Servicio de Anatomía Patológica; ³Servicio de Ginecología y Obstetricia, Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell, España.

Resumen

Objetivos docentes: Describir la anatomía normal y las variantes anatómicas. Conocer las técnicas de imagen utilizadas para su estudio. Revisar la patología benigna y maligna. Proponer un algoritmo de aproximación diagnóstica.

Revisión del tema: El complejo areola-pezón (CAP) puede verse afectado por una amplia variedad de procesos: anomalías congénitas y patología (benigna y maligna). La clínica entre los diferentes tipos de patología a menudo se solapa. Además, su afectación es determinante en el manejo del cáncer de mama. A partir de la descripción de una serie de casos y de una revisión de la literatura, se hará un repaso de la anatomía del CAP, las diferentes modalidades de imagen disponibles para su estudio y la patología que lo afecta. Además, se propondrá un algoritmo de aproximación diagnóstica estratificado por edad y estado hormonal.

Conclusiones: La detección de la patología del complejo areola-pezón puede ser un reto por la complejidad anatómica y las diferentes presentaciones clínicas. La valoración conjunta clínica y radio-patológica (multimodal) es importante para identificar las anomalías y llegar al diagnóstico de certeza.