



Avances en Diabetología



P-090. - ¿RELACIÓN ENTRE CONSUMO DE TIRAS REACTIVAS, FRECUENTACIÓN DE LA CONSULTA PROGRAMADA DE ENFERMERÍA Y VALORES DE HbA1c?

I. García Herrero^a, C. García Giménez^b, C. Franco Bernardo^a, A. Loyza Millauro^c y C. Moreno González^c

^aEquipo de Atención Primaria de Fuente Álamo. Fuente Álamo. ^bHospital Universitario Santa Lucía. Cartagena.

^cEquipo de Atención Primaria del Puerto de Mazarrón. Mazarrón.

Resumen

Objetivos: El objetivo de nuestro estudio, es comprobar si existe relación entre el consumo de tiras reactivas, y frecuentación de la consulta programada de enfermería con la mejoría clínica en los valores e HbA1c. Para ello decidimos realizar el siguiente estudio.

Material y métodos: Todo paciente que acuda a consulta programada de diabetes entre las fechas 17/01/2014 y 17/07/2014, y que además tenga un mínimo de 2 valores de HbA1c. Estudio observacional descriptivo retrospectivo. N = 126.

Resultados: Veces que acude a consulta glicada sube glicada baja. 1 que representa 33,3%, 38,1%, 61,9%. 2 que representa 7,9%, 40%, 60%. 3 que representa 12,7%, 25%, 75% .4 o más, que representa 46,1%, 41,4%, 58,6%. Con relación a los totales, el 38,1% de los pacientes tuvo incremento de HbA1c, con una media de 4,25 visitas a consulta programada de enfermería en diabetes, con un consumo medio de 175 tiras/año que significo el 40,2% del consumo. El 61,9% de los usuarios tuvo un decrecimiento de HbA1c, con una media de 3,56 visitas a consulta programada de enfermería y un consumo medio de 160 tiras/año significando un 59,8% del consumo.

Conclusiones: No encontramos relación entre visitas a CPE y mejorías de HbA1c. No encontramos relación entre el consumo de tiras reactivas y mejorías en la HbA1C. Por lo tanto, nos encontramos ante la necesidad de replantear el contenido de la consulta programada de enfermería en el programa de diabético, para que esta sea más eficaz.