



O-281 - EFECTO DE LA NEOADYUVANCIA SOBRE EL CÁNCER DE ESÓFAGO. ESTUDIO RETROSPECTIVO

J.J. Segura Sampedro¹, A. Vázquez Medina¹, E. Domínguez-Adame Lanuza², E. Prendes Sillero¹, F. López Bernal¹, A. Cano Matías², J. Padillo Ruiz¹ y F. Ibáñez Delgado¹

¹Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. ²Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Sevilla.

Resumen

Objetivos: Analizar el efecto de la neoadyuvancia sobre cá. de esófago en términos de supervivencia, regresión tumoral y resecabilidad. Estudio de cohortes retrospectivo.

Métodos: Se atendieron 102 pacientes diagnosticados de cáncer de esófago, candidatos potenciales a neoadyuvancia con una edad media de 62 años (32-86), el 85,71% fueron varones. Tipo histológico predominante fue el adenocarcinoma 69,6%, un 26,47% epidermoides, 1,96% GIST y 1,96% neuroendocrinos. Los criterios para aplicar neoadyuvancia fueron según la clasificación TNM y tras comité multidisciplinar, pacientes T3N0, T3Nx y T4Nx seleccionados.

Resultados: Cumplieron criterios para neoadyuvancia el 48% (49). El estadiaje previo a la neoadyuvancia fue de 2,04% T3N0, 95,92% T3Nx, 2,04% T4Nx. Existió una gran regresión, siendo el estadiaje postquirúrgico de T0N0 12,24%, T1N0 4,08%, T2N0 8,16%, T2Nx 4,08%, T3N0 8,16%, T3Nx 46,94%, T4Nx 16,33%. La técnica quirúrgica y morbimortalidad operatoria fue equivalente.

Conclusiones: Tras instaurar neoadyuvancia en pacientes seleccionados, se produce regresión tumoral en más de la mitad de casos. Esta regresión tiene consecuencias directas en términos de resecabilidad y supervivencia.