



O-042 - Seguridad y efectividad en el manejo de fluidos y parámetros hemodinámicos durante la quimiohipertermia intraabdominal cerrada con recirculación de CO₂ mediante la utilización del modelo PRS-1.0 COMBAT. Estudio clínico piloto

S. Sánchez García, D. Padilla Valverde, P. Villarejo Campos, J. Pascual, E.P. García Santos, F.J. Ruescas García, J.L. Bertelli Puche y J. Martín Fernández

Hospital General Ciudad Real, Ciudad Real.

Resumen

Objetivos: La quimiohipertermia intraperitoneal (HIPEC) cerrada puede incrementar la presión intraabdominal y provocar cambios hemodinámicos en los pacientes. Nuestro objetivo es analizar la seguridad y efectividad de nuestra técnica cerrada con recirculación de CO₂ en el manejo de fluidos y parámetros hemodinámicos a través del control de la precarga medida por el Volumen Global al final de la Diástole (Global End Diastolic Values o GEDV) y a través del intercambiador de gases.

Métodos: Estudio clínico piloto (EUDRACT 2011-006319-69) que incluye 18 pacientes con cáncer de ovario avanzado tratados con cirugía citorrreductora y HIPEC. Se utilizó el sistema de recirculación y perfusión de fluidos y CO₂ (PRS Combat[®]) mediante técnica con abdomen cerrado. Se recogieron datos hemodinámicos, gasométricos y de termodilución transpulmonar en tres tiempos: después de la cirugía citorrreductora (T1), a mitad de HIPEC (T2) y después de HIPEC (T3).

Resultados: Estrés térmico: no se registraron cambios gasométricos significativos tras la administración de HIPEC(t1)- ph(t3) (p = 0,21). CO₂/(t1)- CO₂ (t3) (p = 0,38). Se observó estabilidad hemodinámica entre los tres tiempos. Control de fluidos: Los valores iniciales de GEDV (T1) se relacionan de forma significativa con los valores GEDV (T2) (p < 0,001) e ITBI (T2) (p = 0,01), pudiendo controlar así el estado hemodinámico intraHIPEC. Así mismo, se relaciona con el Índice Cardíaco o IC: pre-IC (T1) (p = 0,004) e intra-IC (T2) (p = 0,05). Los valores de GEDV intraHIPEC o T2, nos ayudaron a controlar el índice cardíaco intra y postHIPEC: IC (T2) (p = 0,02) post-IC (T3) (p = 0,01). Se registró un control óptimo de la variación del volumen sistólico postHIPEC: VVS (T3) (p < 0,001). El control del agua extrapulmonar (edema pulmonar o ELWI) se correlacionó con los valores T2 de GEDV: ELWI (T2) p = 0,04. No se observaron cambios en la precarga cardíaca en los tres tiempos analizados: GEDV(T1)-GEDV(T2) (p = 0,771).GEDV(T1)-GEDV(T3) (p = 0,639). GEDV(T2)-GEDV(T3) (p = 0,58).

Conclusiones: La quimiohipertermia cerrada con recirculación de CO₂ es un modelo seguro para la administración de HIPEC en pacientes con cáncer de ovario avanzado. Los valores de precarga cardíaca (GEDI) son útiles para el control del estado hemodinámico y volumétrico de estas pacientes.