



P-116 - DIVERTICULITIS APENDICULAR. ANÁLISIS DE UNA SERIE DE 7 CASOS

M. Ruiz-Piqueras Lecroisey, A. García Marín, M. Mella Laborde, C. Nofuentes Riera, E. Soliveres Soliveres, S. Pérez Bru, M. Pérez López, R. Martínez García, F. Orts Micó, A. Compañ Rosique y S. García García

Hospital Universitario del S.V.S. de San Juan, Sant Joan d'Alacant.

Resumen

Objetivos: La diverticulitis apendicular (DA) es una causa rara de apendicitis aguda que se diagnostica en la mayoría de casos tras el estudio histológico postapendicectomía. El objetivo es analizar nuestra experiencia comparándola con el resto de apendicitis.

Métodos: Estudio prospectivo durante 51 meses (2009-Marzo 2013). Criterios de inclusión: paciente intervenido con sospecha clínica/radiológica de apendicitis. Criterios de exclusión: ausencia de apendicitis en la cirugía. Variables cuantitativas: mediana y percentiles (25; 75). Variables cualitativas: frecuencia (porcentaje). Tests estadísticos: Mann-Whitney (cuantitativas) y chi-cuadrado (cualitativas). Apendicitis complicada: aquella gangrenosa/perforada.

Resultados: De los 498 casos, 449 (90,2%) fueron apendicitis dentro de las que se hallaron 7 (1,5%) DA, diagnosticadas todas en el estudio histológico.

	DA (n = 7)	Resto (n = 442)	Significación
Sexo (Varón/Mujer)	3 (42,9%)/4 (57,1%)	270 (61%)/172 (39%)	0,273
Edad	40 (30; 62)	36 (21; 52)	0,036
Grupos edad			
< 17	0 (0%)	137 (31%)	0,209
18-64	6 (85,7%)	264 (59,7%)	
> 65	1 (14,3%)	41 (9,3%)	
Tiempo de evolución (horas)	28 (25; 58)	35 (26; 56)	0,972
Temperatura	36,6 (36,1; 37,1)	36,9 (36,4; 37,4)	0,371
Leucocitos	13300 (10700; 15700)	14700 (12300; 17600)	0,513
Neutrófilos	87,1 (84,6; 89,6)	81,6 (75,1; 86,4)	0,255
Bilirrubina	0,8 (0,4; 1,3)	1,1 (0,8; 1,4)	0,965
SRIS (Sí/No)	1/6	157/285	0,228
PCR	1,82 (0,59; 5,31)	2,71 (0,67; 7,5)	0,261
Score Alvarado	7 (6; 8)	7 (5; 7)	0,269
Score diagnóstico de apendicitis	6 (5; 7)	6 (5; 6)	0,381

Complicada (Si/No)	5 (71,4%)/2 (28,6%)	184 (41,6%)/258 (58,4%)	0,116
Complicaciones posoperatorias	2 (28,6%)	77 (17,4%)	0,356
Infección herida	1 (14,2%)	35 (8%)	0,656
Absceso intraabd	1 (14,2%)	22 (5%)	0,616

Conclusiones: La DA aparece en pacientes con edad superior al resto, no habiendo encontrado casos en menores de 18 años así como una mayor tasa de debut complicado no alcanzando en esto significación. No presentó diferencias en los parámetros clínicos, analíticos ni en tasa de complicaciones.