



## O-086 - RESULTADOS INICIALES DEL REGISTRO DE CARCINOMAS ESÓFAGO-GÁSTRICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

*Escrig, Javier<sup>1</sup>; Mingol, Fernando<sup>2</sup>; Marti, Roberto<sup>3</sup>; Puche, Jose<sup>4</sup>; Trullenque, Ramon<sup>5</sup>; Asencio, Francisco<sup>6</sup>; Alberich, Carmen<sup>7</sup>; Lacueva, Javier<sup>8</sup>*

<sup>1</sup>Hospital General Universitario de Castellón, Castellón; <sup>2</sup>Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia; <sup>3</sup>Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia; <sup>4</sup>Hospital General Universitario de Valencia, Valencia; <sup>5</sup>Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia; <sup>6</sup>Hospital Arnau de Vilanova, Valencia; <sup>7</sup>Servicio de Estudios Epidemiológicos y Estadísticas Sanitarias de la Comunidad Valenciana, Valencia; <sup>8</sup>Hospital General Universitario de Elche, Elche.

### Resumen

**Objetivos:** Evaluar los resultados iniciales del registro de tumores esófago-gástricos desarrollado conjuntamente por la Sociedad Valenciana de Cirugía y la Conselleria de Sanitat de la Comunidad Valenciana.

**Métodos:** Participaron 14 de los 24 hospitales públicos de la Comunidad Valenciana. Se evaluaron todos los pacientes con diagnóstico de carcinoma de esófago y de estómago operados desde enero 2013 hasta diciembre 2014. Se analizaron variables demográficas, clínicas e histopatológicas.

**Resultados:** Se incluyeron 434 pacientes, 120 con carcinoma de esófago y 314 con carcinoma gástrico. Solo en dos centros se operaron a más de 10 pacientes con cáncer de esófago/año. La esofagectomía transtorácica fue el abordaje más frecuente (84,2%) en los tumores de localización esofágica. En el 50,9% de los carcinomas de la unión esófago-gástrica (UEG) se realizó una gastrectomía total. La mortalidad postoperatoria tras esofagectomía y gastrectomía fue 7,3% y 9,4% respectivamente. Antes de la cirugía, los tumores esofágicos del tercio medio fueron tratados mayoritariamente (76,5%) con quimiorradioterapia. Por el contrario, los de tercio inferior y los de la UEG fueron tratados preferentemente solo con quimioterapia (45,5% y 53,4%). El 73,6% de los pacientes con carcinoma gástrico no recibió tratamiento neoadyuvante. La mitad de los pacientes con carcinoma esofágico o gástrico no recibió ningún tratamiento adyuvante.

**Conclusiones:** Este registro muestra que en la Comunidad Valenciana, la mitad de los pacientes con cáncer de esófago son operados en hospitales con una casuística menor de 10 casos/año. Asimismo, ha detectado posibilidades de mejora relevantes en indicadores de resultado de los carcinomas esofágicos y gástricos.