



# Cirugía Española



[www.elsevier.es/cirugia](http://www.elsevier.es/cirugia)

## O-123 - REMISIÓN DE LA DIABETES A LARGO PLAZO TRAS CIRUGÍA BARIÁTRICA

*Gil Rendo, Aurora; Martínez de Paz, Fernando; Menchén Trujillo, Bruno; Sánchez Forero, Juan Alberto; Alberca Páramo, Ana; Sánchez Guerrero, Paloma; Picón Rodríguez, Rafael; Martín Fernández, Jesús*

*Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real.*

### Resumen

**Introducción:** La cirugía bariátrica ha demostrado un adecuado control de la diabetes mellitus (DM), incluso superior al conseguido con tratamiento médico según demuestran los últimos estudios controlados y aleatorizados.

**Objetivos:** El objetivo de este estudio es examinar si a largo plazo esta tasa de remisión se mantiene y cuál es el índice de recaída de la diabetes a partir del quinto año tras la cirugía. Y los factores predictivos de remisión a largo plazo.

**Métodos:** Llevamos a cabo un estudio retrospectivo de pacientes intervenidos de cirugía bariátrica en nuestro hospital entre 2006 y 2011. Los criterios de inclusión fueron dos: ser diabético con tratamiento médico de al menos 6 meses de evolución y tener un seguimiento postoperatorio de al menos 5 años. Se tuvieron en cuenta los criterios de remisión de la DM de la SECO y SEDO y se calculó el porcentaje de exceso de peso perdido y el índice de reganancia de peso.

**Resultados:** El 21,3% de los pacientes intervenidos eran diabéticos y de los 50 pacientes que cumplieron criterios de inclusión 36 (72%) eran mujeres y 14 (28%) varones. Con una edad media de 48,76 años, IMC medio de 49,8 Kg/m<sup>2</sup> y un tiempo medio de seguimiento de 6,76 años. Más de la mitad de los pacientes tienen más de 7 años de seguimiento. La tasa de resolución de la diabetes a los 5 años es de un 86%, pero a largo plazo (> 5 años) desciende a 74%. Con una tasa de recaída de la diabetes de un 13,9% y de reganancia de peso de 21,4%. La resolución a largo plazo es significativamente mayor en los pacientes con menor IMC preoperatorio, aquellos tratados con antidiabéticos orales (ADO) en lugar de Insulina y los que parten de un mejor control glucémico preoperatorio según cifras de hemoglobina glicosilada.

**Conclusiones:** La cirugía bariátrica consigue una tasa alta de remisión de la DM que incluso se mantiene después de los 5 años, aunque existe una tasa de recaída de 13,9%.