



## P-202 - COLEDocolITIASIS EN PACIENTES MAYOR QUE 85 AÑOS: INCIDENCIA Y RESULTADOS DE LA CPRE

Gardenyes Martínez, Júlía<sup>1</sup>; Leal Valdivieso, Carles<sup>1</sup>; Hermoso Bosch, Judit<sup>1</sup>; de Cózar Duch, Jordi<sup>1</sup>; Marani, Héctor Ivo<sup>2</sup>; García Ibáñez, Pere<sup>3</sup>; Saló Rich, Joan<sup>1</sup>; Vallverdú Cartié, Helena<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Consorti Hospitalari de Vic, Vic; <sup>2</sup>Hospital de Sant Jaume, Olot; <sup>3</sup>Hospital de Campdevàdol-Hospital Comarcal del Ripollès, Campdevàdol.

### Resumen

**Introducción:** El envejecimiento de la población aumenta progresivamente y, en España, la esperanza de vida es una de las más altas del mundo. La incidencia de coledocolitiasis y los resultados de la CPRE en los pacientes de edad avanzada no se han analizado completamente.

**Objetivos:** Conocer la incidencia de coledocolitiasis sintomática tratada mediante CPRE en los pacientes de  $\geq 85$  años. Analizar los acontecimientos adversos post-CPRE y la mortalidad en este grupo de pacientes.

**Métodos:** Los datos de ingresos por coledocolitiasis sintomática se obtuvieron a partir de los registros hospitalarios de nuestro centro. Los datos relativos a las CPRE se obtuvieron a partir de una base de datos en la que se habían registrado las complicaciones de las CPRE prospectivamente. Se analizan las CPRE de los años 2013-2014 realizadas sobre pacientes de tres comarcas catalanas (248.000 habitantes). Se analizan los acontecimientos adversos post-CPRE (específicos a la técnica según los criterios de Cotton o debidos a comorbilidades y/o síndromes geriátricos registrados en la historia clínica), la mortalidad asociada en el primer mes. Los datos demográficos se obtienen de la base de datos del IDESCAT.

**Resultados:** En Cataluña, la población de  $\geq 85$  años representa el 2,7% de la población y en el área analizada el 3,2%. En el período estudiado, hubo 159 admisiones por coledocolitiasis sintomática, de las cuales 52 (33%) correspondieron a pacientes  $\geq 85$  años (1,3% de los ingresos hospitalarios en este grupo de edad); el 25% tenían colecistectomía previa. La incidencia global de coledocolitiasis que requirió de CPRE en la población de las tres comarcas fue de 3,9 casos-10.000 habitantes-año mientras que en el grupo  $\geq 85$  años fue de 34,2 ( $p < 0,05$ ). Asimismo, en los pacientes de  $\geq 85$  años con coledocolitiasis fue de 26,5 casos por 10.000 habitantes-año y en aquellos con colecistectomía previa de 8,5 casos por 10.000 habitantes-año. En los 52 pacientes  $\geq 85$  años se registraron 15 acontecimientos adversos (29%): 5 (10%) específicos (1 pancreatitis, 1 hemorragia, 2 perforaciones y 1 colangitis) y 10 (19,2%) en relación a descompensaciones de su patología de base y/o síndromes geriátricos. No hubo diferencias significativas entre la tasa de complicaciones específicas en los pacientes  $\geq 85$  años respecto al resto de pacientes ( $p = 0,9$ ). La mortalidad a 30 días fue 7,7% en el grupo de pacientes  $\geq 85$  años (la mitad por complicaciones específicas post-CPRE), mientras que en el resto de pacientes ( $< 85$  años) fue nula.

**Conclusiones:** La incidencia de coledocolitiasis que requiere de CPRE es más elevada en los pacientes de  $\geq 85$  años y 1/3 de todas las CPRE realizadas fueron indicadas en este grupo de pacientes. Asimismo, 1/3 de éstos desarrollaron algún acontecimiento adverso (médico o específico post-CPRE). El espectro de acontecimientos adversos post-CPRE en los  $\geq 85$  años es relevante, de manera que la indicación de la CPRE debe estar bien justificada.