



V-143 - MANEJO DEL PROLAPSO DE LA NEOVAGINA DE COLON SIGMOIDE MEDIANTE SACROPEXIA LAPAROSCÓPICA, EN UN CASO DE DISFORIA DE GÉNERO

Cholewa, Hanna; Sancho Muriel, Jorge; Mansanet Mogort, Albert; Primo Romaguera, Vicent; Millán Scheiding, Mónica; Frasson, Matteo; Blasco Piqueras, Raquel; Flor Lorente, Blas

Hospital Universitario La Fe, Valencia.

Resumen

Objetivos: Presentar mediante un vídeo, la resolución quirúrgica del prolapso de la neovagina (de colon sigmoide, creada durante cirugía por disforia de género) mediante sacropexia laparoscópica, con malla GORE® Synecor.

Caso clínico: Presentamos el caso de una paciente de 53 años, con diagnóstico de disforia de género masculino a femenino (MTF), intervenida en 2018 de vaginoplastia con inversión de pene y reintervenida en 2019 por estenosis de la vaginoplastia realizándose una neovagina con colon sigmoide, por laparoscopia y con aplicación de verde de indocianina. En 2022 la paciente vuelve a consultar a cirugía general por prolapso de la neovagina (grado IV), mucorrea y molestias en el periné. Se realiza una exploración laparoscópica, liberando la neovagina y realizando su pexia al sacro mediante malla GORE® Synecor que se fija con puntos sueltos y *tackers* irreabsorbibles, ProTack™.

Resultados: La paciente evoluciona de manera favorable, siendo dada de alta al segundo día posoperatorio. En el control a los 3 meses en consulta externa esta asintomática, sin recidiva del prolapso.

Conclusiones: La sacropexia laparoscópica de la neovagina de colon sigmoide es una opción terapéutica válida en el tratamiento de prolapso.