



# Cirugía Española



[www.elsevier.es/cirugia](http://www.elsevier.es/cirugia)

## V-061 - ESPLENECTOMÍA PARCIAL LAPAROSCÓPICA

*García Monforte, M<sup>a</sup> Nieves; Serra Pla, Sheila; Bejarano González, Natalia; Romaguera Monzonís, Andreu; Flores Clotet, Roser; García Borobia, Francisco Javier; Navarro Soto, Salvador*

*Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell.*

### Resumen

**Objetivos:** Mostrar técnica quirúrgica de la esplenectomía parcial laparoscópica.

**Caso clínico:** Se presenta el caso de una paciente de 33 años que consulta por molestias vagas abdominales. Las exploraciones complementarias: ecografía abdominal, TC y RM muestran gran quiste (6 cm) en polo inferior esplénico. Se propone esplenectomía parcial laparoscópica. Se realiza esplenectomía parcial laparoscópica. La paciente es dada de alta al tercer día postoperatorio sin complicaciones. La anatomía patológica mostró la presencia de un quiste mesotelial.

**Discusión:** La esplenectomía parcial es una técnica poco habitual en adultos, que se usa más en niños en un intento de preservar el máximo de tejido esplénico posible. En el caso que presentamos se trata de una mujer joven y con sospecha de patología benigna, por lo que se valoró la posibilidad de realizar la esplenectomía parcial. Se trata de una intervención técnicamente factible siempre que se deje suficiente tejido esplénico para conservar una función inmunitaria correcta. Esto ahorra al paciente el riesgo de sufrir una sepsis fulminante y la necesidad de la vacunación profiláctica frente gérmenes encapsulados.