



218 - NUTRICIÓN PARENTERAL DE CORTA DURACIÓN: PACIENTES CON UN PERFIL CLÍNICO DIFERENTE

A.E. Sirvent Segovia^a, R.P. Quílez Toboso^b, J.J. Alfaro Martínez^a, A. Hernández López^c, L. García Blasco^a, M. Olmos Alemán^a, C.M. Jiménez Martínez^a y A.J. Moya Moya^a

^aComplejo Hospitalario Universitario de Albacete. ^bHospital General de Villarrobledo. ^cHospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Resumen

Introducción: La nutrición parenteral (NP) está indicada en pacientes que no son capaces de cubrir sus necesidades con dieta durante 7 o más días en los que el tracto digestivo no es funcional, aunque en pacientes con desnutrición grave puede haber indicación de NP en ayunos de menor duración.

Objetivos: Conocer las características de los pacientes que reciben NP durante menos de 5 días y compararlas con los que reciben NP de mayor duración.

Métodos: 242 pacientes que recibieron NP con una duración menor de 5 días se compararon con 1.406 pacientes que recibieron NP de mayor duración. Se registraron edad, sexo, enfermedad de base, motivo de indicación de NP, presencia de comorbilidad y exitus hospitalario.

Resultados: No hubo diferencias significativas entre los dos grupos en edad (66,0 frente a 64,9 años) ni sexo (60,3% varones frente a 63,8%). Los pacientes con NP de corta duración tuvieron mayor frecuencia de comorbilidad (64,9% frente a 42,3%) y de exitus durante el ingreso (26,0% frente a 14,8%). Hubo diferencias significativas en patología de base (tabla 1) y motivo de indicación (tabla 2).

Tabla 1

%	Digestiva no oncológ.	Oncológ. digestiva proximal	Oncológ. digestiva distal	Oncológ. órg. sólido no digest.	Oncológ. hematológ.	Vascular abdominal	Otras
NP corta	28,9	21,5	11,6	12,0	6,6	4,1	15,3
NP larga	33,3	21,8	13,0	14,2	9,8	2,8	5,0

Tabla 2

%	Íleo postQx	Compls. postQx	Hemorr. digest.	Diarrea	Pancreat.	Íleo paral. no Qx	Íleo mecán.	Mucositis	Otras
NP corta	51,7	8,7	4,5	5,8	1,2	3,7	2,5	4,1	17,8
NP larga	43,2	18,9	2,7	3,5	3,6	2,3	4,7	8,0	13,2

Conclusiones: Existen diferencias significativas entre los pacientes que reciben NP de corta duración y el resto, principalmente en la mayor presencia de comorbilidad y mortalidad durante el ingreso, además de diferencias en la enfermedad de base y motivo de indicación.