



218 - NUTRICIÓN PARENTERAL DE CORTA DURACIÓN: PACIENTES CON UN PERFIL CLÍNICO DIFERENTE

A.E. Sirvent Segovia^a, R.P. Quílez Toboso^b, J.J. Alfaro Martínez^a, A. Hernández López^c, L. García Blasco^a, M. Olmos Alemán^a, C.M. Jiménez Martínez^a y A.J. Moya Moya^a

^aComplejo Hospitalario Universitario de Albacete. ^bHospital General de Villarrobledo. ^cHospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.

Resumen

Introducción: La nutrición parenteral (NP) está indicada en pacientes que no son capaces de cubrir sus necesidades con dieta durante 7 o más días en los que el tracto digestivo no es funcional, aunque en pacientes con desnutrición grave puede haber indicación de NP en ayunos de menor duración.

Objetivos: Conocer las características de los pacientes que reciben NP durante menos de 5 días y compararlas con los que reciben NP de mayor duración.

Métodos: 242 pacientes que recibieron NP con una duración menor de 5 días se compararon con 1.406 pacientes que recibieron NP de mayor duración. Se registraron edad, sexo, enfermedad de base, motivo de indicación de NP, presencia de comorbilidad y exitus hospitalario.

Resultados: No hubo diferencias significativas entre los dos grupos en edad (66,0 frente a 64,9 años) ni sexo (60,3% varones frente a 63,8%). Los pacientes con NP de corta duración tuvieron mayor frecuencia de comorbilidad (64,9% frente a 42,3%) y de exitus durante el ingreso (26,0% frente a 14,8%). Hubo diferencias significativas en patología de base (tabla 1) y motivo de indicación (tabla 2).

Tabla 1

| % | Digestiva no oncológ. | Oncológ. digestiva proximal | Oncológ. digestiva distal | Oncológ. órg. sólido no digest. | Oncológ. hematológ. | Vascular abdominal | Otras |
|----------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|-------|
| NP corta | 28,9 | 21,5 | 11,6 | 12,0 | 6,6 | 4,1 | 15,3 |
| NP larga | 33,3 | 21,8 | 13,0 | 14,2 | 9,8 | 2,8 | 5,0 |

Tabla 2

| % | Íleo postQx | Compls. postQx | Hemorr. digest. | Diarrea | Pancreat. | Íleo paral. no Qx | Íleo mecán. | Mucositis | Otras |
|----------|-------------|----------------|-----------------|---------|-----------|-------------------|-------------|-----------|-------|
| NP corta | 51,7 | 8,7 | 4,5 | 5,8 | 1,2 | 3,7 | 2,5 | 4,1 | 17,8 |
| NP larga | 43,2 | 18,9 | 2,7 | 3,5 | 3,6 | 2,3 | 4,7 | 8,0 | 13,2 |

Conclusiones: Existen diferencias significativas entre los pacientes que reciben NP de corta duración y el resto, principalmente en la mayor presencia de comorbilidad y mortalidad durante el ingreso, además de diferencias en la enfermedad de base y motivo de indicación.