



249 - ADICCIÓN A LOS ALIMENTOS Y RESPUESTA PRECOZ A LA CIRUGÍA BARIÁTRICA

J.J. Prados Carmona^a, M.D. Alcántara Laguna^b, Á. Rebollo Román^b, V. Herrero Aguayo^c, J. Ruiz Rabelo^b, A. Membrives^b, R.M. Luque^c, M.J. Molina^b, M.Á. Gálvez Moreno^{a,b,c} y A.D. Herrera-Martínez^{b,c}

^aUniversidad de Córdoba. ^bHospital Universitario Reina Sofía. Córdoba. ^cInstituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba.

Resumen

Introducción: La cirugía bariátrica (CB) es la estrategia con mejor pérdida ponderal (PP) y respuesta metabólica en obesidad mórbida. En población española se desconoce la prevalencia de adicción a alimentos y su relación con la respuesta a CB.

Objetivos: Valorar las conductas adictivas a alimentos previas a CB y su relación con la respuesta precoz al mes.

Métodos: Estudio descriptivo longitudinal prospectivo (junio-junio). Se valoró la adicción a alimentos mediante test de Yale en pacientes caucásicos con obesidad mórbida. El resultado se relacionó con variables clínicas, bioquímicas y calidad de vida antes y 1 mes tras CB.

Resultados: N = 110 (62,7% mujeres; 45 ± 10 años; IMC pre-cirugía: 46,36 ± 7,8 Kg/m². El%PP al mes: 18,7 ± 5 kg en mujeres; 24,3 ± 12 en hombres. Según test de Yale 11,3% de pacientes tuvieron consumo mayor al previsto; 91,8% deseo persistente; 38,7% mayor tiempo de recuperación tras ingesta; 35% disminución de actividades; 56,8% consumo continuo incluso sabiendo el perjuicio; 60,7% tolerancia; 27,3% síntomas de retirada y 30,1% afectación clínica. 58% tuvieron 3 o más parámetros de conducta adictiva. Los pacientes con conductas adictivas (mayor tiempo de recuperación, disminución de act. diarias, afectación clínica o presencia de 3 o más parámetros) tenían peor calidad de vida subjetiva previa a CB (autoestima, act. física, social, laboral y sexual; p < 0,05). Uso continuado se vinculó con edad (p = 0,05). La tolerancia se relacionó con la percepción subjetiva social (p < 0,05) y laboral (p = 0,06). Tras 1 mes aquellos con síntomas de retirada tuvieron cambios en nivel de masa magra (p = 0,07) y agua corporal (p < 0,05). Mujeres con uso continuo, tolerancia o 3 o más parámetros tuvieron mayor PP al mes (p < 0,05).

Conclusiones: La adicción a alimentos se relacionó con parámetros antropométricos y calidad de vida prequirúrgicos y con cambios al mes posterior. Evaluarla ofrece información complementaria en pacientes sometidos a CB.