



# Endocrinología, Diabetes y Nutrición



## P-132 - FRECUENCIA DE DESCOMPENSACIONES GLUCÉMICAS EN 2 ÁREAS QUIRÚRGICAS

P. Losada Mora, A.M. Garrido Castro, M. Molina Vega y J.L. Carrillo Linares

Hospital Virgen de la Victoria, Málaga.

### Resumen

**Objetivos:** Analizar los motivos de consulta más frecuentes por los que se realizan hojas de interconsulta sobre pacientes ingresados en Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT) y Cirugía Vascul ar (CV) a un equipo (E) asignado al control de patologías médicas, compuesto por profesionales de Endocrinología, Medicina Interna y Cardiología.

**Material y métodos:** Análisis descriptivo de los motivos de consulta sobre pacientes ingresados en COT y CV que sufrieron algún tipo de descompensación médica que precisó avisar a E.

**Resultados:** Desde junio de 2008 a noviembre de 2014 se realizan: 1.486 interconsultas desde COT a E. La consulta más frecuente fue "disnea" en 371 casos (25%), seguido de "control de pluripatología" en 163 (11%), "control de diabetes" y "de tensión arterial" ambos con 124 (8,3%) y 123 (8,3%) consultas. La patología digestiva ocupó un 10,5% de las consultas. Un 4% de las consultas fue por "alteraciones en la analítica". Se analizó disnea, por ser un término demasiado inespecífico. El 48,7% de las disneas fueron de origen respiratorio, el 41% de las disneas fueron de origen cardiológico. El resto de disneas fueron principalmente debidas a ansiedad (4,7%). En un 3,7% de los casos no se objetivó disnea. 173 interconsultas desde CV. El motivo de consulta más frecuente fue "disnea" en 62 casos (35,8%), seguido de "control de pluripatología" en 18 (10,4%), "disminución del nivel de conciencia" en 13 (7,5%), fiebre 13 (7,5%) insuficiencia renal 7 (4%), "control de tensión arterial" 7 (4%), hiperglucemia 4 (2,3%) e hipoglucemia 4 (2,3%). Llama la atención el escaso número de consultas respecto a control de TA y diabetes, lo que demuestra un buen control de dichas patologías por parte de esta unidad. Se analizó disnea: el 43,5% de las disneas fueron de origen respiratorio y el 33,8% fueron de origen cardiológico. En un 11,3% de los casos no se estableció un diagnóstico específico de disnea.

**Conclusiones:** La disnea es la consulta más frecuente por parte de estos dos servicios quirúrgicos. Las alteraciones glucémicas aisladas corresponden a un 8,3% de las consultas procedentes de COT y un 4,6% de las de CV. Asociados a otros factores, las tasas son del 11% y 10,4% respectivamente, lo que supone cifras superiores al 15% en CV y cercanas al 20% en COT.