



29 - CONCORDANCIA EN LA VALORACIÓN DE LA PREPARACIÓN PARA LA COLONOSCOPIA ENTRE ENDOSCOPISTAS Y ENFERMEROS

S. Machlab^{1,2}, E. Martínez-Bauer^{1,2}, V. Puig-Divi¹, F. Junquera¹, A. Lira¹, C. Díaz¹, M. Ruiz¹, A. Sánchez¹, M. Chuecos¹, F. Balada¹, S. Mayor¹, L. Hernández¹, L. Pascual¹, L. Roca¹, J. Serra¹, C. Bueno¹, S. Poveda¹, L. Moreno¹, M. Galván¹, L. Gorchs¹, C. Rodríguez¹, G. Grau¹, X. Calvet¹ y R. Campo¹

¹Unidad de endoscopia digestiva, Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí I³PT, Parc Taulí Hospital Universitari, Barcelona. ²Departamento de Medicina, Universidad Autónoma de Barcelona.

Resumen

Introducción: La preparación adecuada del colon es fundamental para la calidad de la colonoscopia. Es un factor que influye sobre otros considerados en la calidad como la intubación cecal, el tiempo de retirada y la tasa de detección de pólipos y adenomas. En la actualidad el método más extendido en práctica clínica para la valoración de la preparación es la escala de Boston. En su validación de alcanzó una alta concordancia interobservador. Esta escala se caracteriza por su simplicidad y fácil aplicación. En ocasiones la diferencia entre Boston 2 y 3 es sutil y puede generar debate. Un aspecto limitante es que su validación no se ha realizado en un contexto clínico y con un número escaso de vídeos. Por otro lado, no se ha explorado la aportación que puede realizar el personal de enfermería en su valoración.

Objetivos y métodos: Describir la tasa de concordancia en la valoración de la preparación de colonoscopias de cribado entre el endoscopista y los dos enfermeros en sala. Análisis post-hoc de una base de datos prospectiva en la que se ha registrado la escala de Boston desglosada por segmentos y de forma ciega entre observadores. Se define preparación adecuada como aquella con una puntuación superior a 1 en todos los segmentos. El personal de enfermería no ha recibido por el momento formación en el uso de la escala. Se espera realizar la formación en la segunda fase del estudio.

Resultados: Se analizan 88 colonoscopias valoradas por 6 endoscopistas y 17 enfermeros.

Tasa de concordancia en la valoración por segmento y global según la escala de Boston

Segmento	Todos	Médico - Enf A	Médico - Enf B	Enf A - Enf B
Global	6%	47%	57%	66%
Derecho	34%	75%	77%	84%
Transverso	64%	51%	82%	78%
Izquierdo	60%	72%	56%	84%

Concordancia en adecuación de la preparación

Segmento	Todos	Médico - Enf A	Médico - Enf B	Enf A - Enf B
----------	-------	----------------	----------------	---------------

Global	96%	98%	99%	96%
Derecho	99%	99%	100%	99%
Transverso	97%	99%	99%	97%
Izquierdo	97%	98%	100%	97%

Conclusiones: Se obtiene una alta concordancia en la valoración de la adecuación de la preparación y baja en la valoración de las categorías de la escala del Boston.