



Gastroenterología y Hepatología



<https://www.elsevier.es/gastroenterologia>

130 - REINGRESO PRECOZ EN PACIENTES HOSPITALIZADOS POR HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA AGUDA

B. García-Sague¹, L. Llovet¹, E. Brunet¹, P. García-Iglesias¹, A. Soria¹, J. Vives¹, E. Frisancho¹, L. Melcarne¹, X. Calvet¹, A. Lira², S. Machlab² y E. Martínez Bauer²

¹Gastroenterología; ²Endoscopia, Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell.

Resumen

Introducción: El reingreso hospitalario precoz (< 30 días tras el alta hospitalaria) se considera un marcador de calidad en la atención del paciente en numerosos sistemas de salud. Las causas del reingreso precoz en la hemorragia digestiva baja aguda (HDB) está poco descrito a pesar de ser una patología frecuente en gastroenterología.

Métodos: El objetivo del estudio fue identificar el número y la etiología del reingreso hospitalario precoz (30 días) tras la hospitalización por HDB. Los pacientes se identificaron desde la base de datos hospitalaria utilizando el ICD-9 (International Classification of Diseases). Se realizó una revisión retrospectiva de historias clínicas entre enero de 2013 y diciembre de 2017.

Resultados: Se identificaron un total de 465 pacientes consecutivos ingresados por HDB. La mediana de edad fue de 76,5 años (rango 23-97), 309 (66,5%) d \geq 70 años, 243 (52%) eran hombres. Treinta y nueve (8,4%) presentaron resangrado, 121 (25,7%) precisaron transfusión, 63 (13,3%) recibieron tratamiento (59 endoscópicos, 4 embolización). La causa más frecuente de HDB fue la diverticular 133 (28,6%). Las características de los pacientes se resumen en la tabla 1. De los 365 pacientes con HDB; 68 (14,6%) precisaron reingreso precoz. La recidiva hemorrágica fue el motivo en 20 pacientes (29,4%), la causa infecciosa en 8 pacientes (11,8%), el dolor abdominal en 9 (13,2%), la diarrea en 5 (7,4%) y otros motivos en 22 (32,4%). Las características de los pacientes con reingreso precoz se resumen en la tabla 2.

Tabla 1: Características de los pacientes

	N / %
Edad (media \pm DS)	73,11 \pm 13,9
Sexo (hombre)	243 (52)
Hemorragia Severa	139 (29,3)
Transfusión	121 (25,7)
Tratamiento (endos + emboliz)	63 (13,3)
Anticoagulación	97 (20,1)
AAS	173 (37,1)
Clopidogrel	40 (8,5)
AINE	79 (16,4)
IBP	277 (59,2)

Conclusiones: El reingreso precoz de los pacientes con HDB es elevado (14,6%). El reingreso por recidiva no es la causa más frecuente. Se deben tener en cuenta otra causa como mal control del dolor en colitis isquémica.