



# Gastroenterología y Hepatología



<https://www.elsevier.es/gastroenterologia>

## 186 - CARCINOMA ESCAMOSO DE ESÓFAGO: ¿UN ENEMIGO QUE VUELVE?

M.M. Díaz Alcázar, A. Martín-Lagos Maldonado y A. García Robles

Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada.

### Resumen

**Introducción:** El carcinoma escamoso o epidermoide esofágico tradicionalmente representaba el 90% de los tumores malignos de esófago. Sin embargo, en los últimos años su incidencia ha disminuido, y en Europa y Norteamérica el tipo histológico predominante es el adenocarcinoma. El cáncer de células escamosas sigue siendo más frecuente en Asia, África y Sudamérica, en el llamado “cinturón del cáncer esofágico”.

**Métodos:** Serie de casos en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio (Granada) y revisión bibliográfica.

**Resultados:** En nuestro centro se han diagnosticado durante el año 2020 31 tumores de esófago, de los cuales ocho fueron de estirpe histológica escamosa, mientras que en 2019 solo hubo dos casos de esta estirpe. La tabla resume los datos de los ocho casos de carcinoma escamoso de esófago diagnosticados en 2020.

Caso	Sexo	Edad	Tabaco	Alcohol	Localización	Extensión	Tratamiento	Supervivencia
1	Hombre	66	Exfumador	Consumo moderado	Esófago medio-distal	Invasión mediastínica. Ecoendoscopia no realizada por estenosis esofágica no franqueable	QT	1 mes, éxito
2	Hombre	60	Sí	Exbebedor	Esófago medio	cT3-4 N2 M0	QT, suspendida → paliativo	11 meses
3	Mujer	82	No	No	Esófago medio-distal	Adenopatías pretraqueales, ecoendoscopia no realizada por actitud paliativa	Paliativo	9 meses
4	Hombre	58	Sí	Consumo moderado	Esófago medio-distal	cT2 N0 M0	QT-RT neoadyuvante + cirugía	5 meses
5	Hombre	82	Exfumador	Consumo moderado	Esófago medio	cT3 N1 M1	QT-RT	8 meses
6	Hombre	59	Exfumador	Exbebedor	Esófago distal	pT1b	DSE con márgenes afectos → cirugía	9 meses
7	Hombre	67	Exfumador	Consumo moderado	Esófago proximal	cT4b N2 M0	QT-RT	7 meses
8	Hombre	67	Fumador	Consumo elevado	Esófago proximal-medio	cT3 N2 M0	QT-RT	6 meses

**Conclusiones:** En nuestra serie el cáncer de células escamosas representa el 25,8% de los tumores esofágicos, con un aumento del 300% respecto al año anterior. Los principales factores de riesgo

para el cáncer escamosos son alcohol y tabaco, presentes en el 87,5% de los casos de nuestra serie. La combinación de ambos factores, frecuente en la serie, aumenta aún más el riesgo, así como el antecedente un tumor del área aerodigestiva superior. Entre otros factores de riesgo se incluyen ingesta escasa de frutas y verduras, alimentos con componentes nitrosos, carnes rojas, virus del papiloma, acalasia e ingesta de cáusticos. En países de alta incidencia no hay diferencias entre sexos, mientras que en países de baja incidencia, como en nuestra serie, predomina en hombres (87,5%). Destaca que la única mujer no tenía antecedente de tabaco ni alcohol. El cáncer escamoso suele estar localizado en esófago medio, como en el 75% de pacientes de nuestra serie. Independientemente de la histología, el 50-80% de los pacientes con cáncer de esófago debutan incurables, localmente avanzados no resecables o con metástasis, como se corrobora en nuestra serie.