



Gastroenterología y Hepatología



<https://www.elsevier.es/gastroenterologia>

81 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL, ¿UN FACTOR DE RIESGO DE INFECCIÓN POR *CLOSTRIDIODES DIFFICILE*?

C. Pradera Cibreiro, M. Ramos Alonso, M. Fernández López, T. González Furelos, R. Fraga Iriso, V. Mauriz Barreiro, G. Molina Arriero, V. Ollero Pena, A. Echarri Piudo

Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.

Resumen

Introducción: En la literatura actual, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) tienen mayor incidencia y riesgo de infección por *Clostridioides difficile* (ICD) y de su posterior recurrencia. Respecto a la población general, la combinación de ICD y EII se asocia a peor respuesta a terapia médica, mayor gravedad y necesidad de cirugía y a estancia hospitalaria más prolongada.

Métodos: Estudio retrospectivo y unicéntrico para caracterizar y comparar a los pacientes diagnosticados de ICD, con y sin EII, en el Hospital Universitario de Ferrol desde enero/2020 a noviembre/2021. Para esta comparativa se seleccionó un subgrupo no-EII emparejado por sexo y edad con el grupo EII. Los resultados se plasman en porcentajes, medianas e intervalos de confianza, y se analizan con la prueba de chi-cuadrado o test de Fisher.

Resultados: 148 pacientes fueron diagnosticados de ICD. Las características clínicas del grupo no-EII (132) y del EII (16) se resumen en las tablas 1 y 2, y la comparación entre ambos en la tabla 3. La comorbilidad e inmunosupresión fueron las únicas variables con diferencias estadísticamente significativas entre grupos ($p < 0,05$). Se detectó mayor tasa de recurrencia y de complicaciones en el grupo-EII respecto al subgrupo emparejado no-EII (7,14% frente a 0% y 6,67% frente a 0, respectivamente), aunque sin diferencias significativas. La tasa de hospitalización fue mayor en el grupo no-EII, pero sin diferencias significativas.

Tabla 1: Características clínicas de la población general.

	TOTAL PACIENTES	EII	NO EII	
Número	148	16	132	
Sexo (%)(hombre vs. mujer)	45.95 vs. 54.05	31.25 vs. 68.75	47.73 vs. 52.27	p = 0.212
Edad media (años)	73 (CI 58-83)	56 (CI 43-66)	75 (CI 62-84)	p < 0.001
Fumadores (%)	10.14 (15)	12.5 (2)	9.85 (13)	p = 0.740
Comorbilidades (%)	87.84	37.5	93.94	p < 0.001
Inmunosupresión (%)	27.7	50	25	P= 0.035

Tabla 2: Características clínicas de la población con EII.

	TOTAL	ENFERMEDAD DE CROHN	COLITIS ULCEROSA	COLITIS INDETERMINADA	
Número (N)	16	8	7	1	
Edad media (años; CI)	56 (CI 43 – 66)	60 (CI 41 – 79)	56 (CI 45 – 63)	45	p = 0.232
Sexo (hombre vs. mujer, %)	31.25 vs. 68.75	57.14 vs. 42.86	12.50 vs. 87.50	0 vs.100	p = 0.170
Fumadores (%)	12.5	0	25	0	p = 0.533
Inmunosupresión (%)	50	28.57	75	0	p = 0.132
EII localización Colon (%, N)	68.75 (11)	37.5 (3)	100 (7)	100 (1)	p = 0.026

Tabla 3: Comparación entre pacientes con EII y pacientes seleccionados del grupo no-EII.

	Pacientes EII	Pacientes no-EII	
Severidad(%)			p = 1,00
No severo	81.25	87.50	
Severo	12.50	12.50	
Fulminante	6.25	0	
Recurrencia (%)	7.14	0	p = 0.483
Complicaciones (%)	6.67	0	p = 0.484
Hospitalización(%)	12.50	37.50	p = 0.220
Origen de la infección (%)			p = 0.638
Comunitario	50.00	50.00	
Nosocomial	50.00	50.00	

Conclusiones: En la literatura, la gravedad, recurrencia y complicaciones de la ICD son mayores en pacientes con EII. En esta población se confirmó esta tendencia, si bien los resultados no fueron

significativos, probablemente debido al pequeño tamaño muestral. Se debe realizar un estudio prospectivo con una población mayor para poder extraer conclusiones más sólidas.