



## 180 - FACTORES PREDICTORES DE LA EVOLUCIÓN DEL DOLOR EN PANCREATITIS AGUDA. ANÁLISIS *POST HOC* DEL ENSAYO CLÍNICO WATERFALL

Lucía Guilabert<sup>1</sup>, José Joaquín Mira<sup>2,3</sup>, Pablo López-Guillén<sup>1</sup>, Alejandro Giménez Buitrago<sup>2</sup>, Neftalí Jara Pérez<sup>1</sup> y Enrique de-Madaria<sup>1,4</sup>

<sup>1</sup>Servicio de Aparato Digestivo, Unidad Biliopancreática, Hospital General Universitario Dr. Balmis, ISABIAL, Alicante. <sup>2</sup>Departamento de Psicología de la Salud, Universidad Miguel Hernández, Elche. <sup>3</sup>Centro de Salud Hospital Provincial-Pla, Departamento de Salud de Alicante, Hospital de San Juan, Alicante. <sup>4</sup>Departamento de Medicina Clínica, Universidad Miguel Hernández, Elche.

### Resumen

#### ***Póster con relevancia para la práctica clínica***

**Introducción:** El dolor es el principal síntoma de la pancreatitis aguda (PA). La mayoría de los pacientes tiene un alivio del dolor relativamente rápido, pero algunos pacientes pueden padecerlo de forma más intensa y duradera. Una predicción precoz de aquellos pacientes que padecerán más dolor permitiría tomar decisiones en cuanto a una mayor potencia del tratamiento analgésico.

**Métodos:** Análisis *post hoc* del ensayo clínico aleatorizado abierto internacional WATERFALL, que comparó fluidoterapia basada en Ringer lactato agresiva (bolo de 20 ml/kg seguido de 3 ml/kg/h) frente a moderada (1,5 ml/kg/h precedido por bolo de 10 ml/kg solo en caso de hipovolemia). El dolor se valoró mediante la escala PAN-PROMISE (escala numérica con rango 0 a 10, ausencia o máximo dolor reportado por el paciente respectivamente) de forma basal, a las 12, 24 y 48 horas. Se analizó el efecto predictivo de 16 variables basales (al reclutamiento del estudio) en la evolución del dolor mediante un modelo lineal general para medidas repetidas.

**Resultados:** Se incluyeron 249 pacientes. Una menor edad, el recuento leucocitario en sangre, la presencia de signos o síntomas de deshidratación y el consumo activo de alcohol fueron factores predictores de dolor en las primeras 48 horas. Variables basales como sexo, consumo de tabaco, índice de masa corporal, comorbilidad, hematocrito, creatinina, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, etiología biliar o aleatorización a fluidoterapia agresiva o moderada no predijeron de forma independiente la intensidad del dolor en los primeros días tras PA.

**Conclusiones:** El tratamiento del dolor podría escalar en función de características, hábitos y variables clínicas para lograr mejores resultados.