



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 210/116 - ¿Y ESOS HEMATOMAS?

E. Sánchez Pablo<sup>a</sup>, C. Celada Roldán<sup>b</sup>, S.I. Roncero Martín<sup>c</sup>, I. Asunción Solá<sup>d</sup> y A.C. Frazao dos Santos<sup>e</sup>

<sup>a</sup>Médico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Cartagena Este. Cartagena. Murcia. <sup>b</sup>Médico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Los Dolores. Cartagena. <sup>c</sup>Médico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud San Javier; <sup>d</sup>Médico Residente de 1º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Torre Pacheco Este. Torre Pacheco. <sup>e</sup>Médico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Los Alcázares. Murcia.

## Resumen

**Descripción del caso:** Mujer de 29 años con antecedentes personales de pielonefritis de repetición y tratamiento con anticonceptivos orales hasta 2 semanas antes. Cuatro días antes del episodio acudió a su médico clínica de síndrome miccional y tras la realización de tira de orina se diagnosticó infección del tracto urinario y se inició tratamiento con cefuroxima 500 mg durante 7 días. Acude a urgencias por presentar, en las 24 horas previas, hematomas en miembros inferiores no precedidos de traumatismo alguno y que han ido aumentando progresivamente de tamaño y extendiéndose a miembros superiores. No ha presentado sangrado a nivel de mucosas.

**Exploración y pruebas complementarias:** En la exploración presentaba buen estado general. Afebril. Malestar hipogástrico. Puñopercusión renal bilateral negativa. Petequias en muñecas, lesiones purpúricas que no desaparecen a la vitropresión en miembros superiores, más evidentes en brazo derecho y hematomas en brazos y piernas de unos 3-4 cm diámetro. Sin diátesis hemorrágica en mucosas. No adenopatías periféricas palpables. Hemograma: hemoglobina 12 g/dl. Plaquetas  $4 \times 10^9/l$ . Resto del hemograma, bioquímica y coagulación normal. Radiografía de tórax y ecografía abdominal sin hallazgos patológicos.

**Juicio clínico:** Trombopenia autoinmune.

**Diagnóstico diferencial:** Púrpura trombopénica inducida por fármacos, púrpura trombopénica inmunitaria, púrpura trombopénica trombótica y otras trombopenias periféricas.

**Comentario final:** Se suspendió el tratamiento antibiótico y la paciente fue ingresada para observación y tratamiento esteroideo parenteral, con evolución favorable ( $38 \times 10^9/l$  de plaquetas) tras dos días, pudiéndose continuar el tratamiento ambulatoriamente. La aparición de este cuadro obliga, además de a retirar el fármaco, a la realización de exploraciones complementarias para descartar otras patologías que puedan estar desencadenándolo y precisa el inicio del tratamiento, aunque no exista sangrado activo, cuando los valores de plaquetas sean inferiores a  $15 \times 10^9/l$ .

## BIBLIOGRAFÍA

1. Farreras-Rozman. Medicina Interna.
2. Carretero López F. Manual CTO de Medicina y Cirugía: Hematología. CTO editorial, Madrid, 2012.
3. [http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/p/68582/p\\_68582.pdf](http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/p/68582/p_68582.pdf)