



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

228/21 - PERSONES GRANS, DIFERENTS TRACTAMENT FARMACOLÒGICS SEGONS PROFESSIONALS?

P. Beato Fernández^a, M. Aragonés Gordi^b, A. Azcona Escolano^c, A. Valls Martínez^e, M. Vilchez Valdés^b, M. Auladell Llorens^d, F. Lechado Moyano^e, B. Valero López^f, R. Alcaraz Díaz^f y J. Pérez Lianes^b

^aConsultori Barri Cotet. Premià de Dalt. Barcelona. ^bInfermera; ^cMetge de Família. Consultori Barri Cotet. Premià de Dalt. Barcelona. ^dMetge de Família; ^eAuxiliar Clínica; ^fInfermera. CAP Premià de Mar. Barcelona.

Resumen

Objectius: Observar si existeixen diferències en les prescripcions farmacològiques dels pacients de més de 80 anys atesos en cadascuna de les 3 consultes d'un centre d'Atenció Primària

Metodologia: Treball observacional descriptiu. Àmbit: els pacients de més de 80 anys atesos en les 3 consultes de medicina de família d'un centre de salut. Es comparen les prescripcions de 20 principis o classe de principis actius diferents a partir de la recepta electrònica. Variables: edat, sexe. Numero de prescripcions de paracetamol, antiinflamatoris (AINEs), tramadol, IECAs, ARAII, calçantonistes, diürètics, betabloquejants, antiagregants, acenocumarol, estartines, metformina, sulfonilurees, insulina, fàrmacs per hiperplàsia de pròstata (HBP), omeprazol o similars, antiosteoporòtics, benzodiazepines, antidepressius, fàrmacs per la demència, absorbents. Mesures: percentatges y mitjanes.

Resultats: 220 pacients (77-67-76). Edats mitjanes: (85,8-84,5-84,4). Percentatge de dones (68,9-70,1-60,5%). Mitjana de medicaments per consulta (8,1-7,3-5,8). Destaquen les diferències de percentatges de prescripcions de: paracetamol (41,6-32,8-31,6%), AINEs (7,8-0-5,3%), tramadol (6,5-10,4-1,31%), IECAs (29,9-47,8-52,6%), ARA II (35,1-16,4-17,1%), calçantonistes (23,4-14,9-35,5%), diürètics (54,5-71,6-46,1%), betabloquejants (18,2-26,9-11,8%), antiagregants (42,34-62,68-31,6%), estatines (53,2-58,2-39,5%), metformina (14,3-14,9-20,8%), sulfonilurees (10,4-7,5-2,6%), per HBP (20,8-45-40%) dels homes, antiosteoporòtics (11,7-4,5-1,3%), benzodiazepines (33,8-34,3-19,7%).

Conclusions: Existeixen diferències importants de percentatges de prescripció en molts dels medicaments estudiats. Aquestes diferències s'atenuen quan se sumen fàrmacs de classes similars (IECAs + ARA II) o per una mateixa indicació (calçantonistes + diürètics, metformina + sulfonilurees). El diferent percentatge de prescripció d'estatines, antiagregants, benzodiazepines, o fàrmacs per la osteoporosi o la HBP demostra que existeixen criteris heterogenis entre els professionals.