



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

228/10 - PERSONES GRANS, REGISTREN ELS DIAGNÒSTICS IGUAL ELS DIFERENTS PROFESSIONALS?

P. Beato Fernández^a, M. Aragonés Gordi^b, A. Valls Martínez^c, A. Azcona Escolano^c, J. Pérez Lianes^b, M. Vílchez Valdés^b, S. Berruezo Domene^b, I. Guimaraes Mazpule^d, N. Domec Balaguer^e y J. Collell Amblàs^e

^aConsultori Barri Cotet. Premià de Dalt. ^bInfermera; ^cMetge de Família; ^dPediatra; ^eGestió i Serveis. Consultori Barri Cotet. Premià de Dalt.

Resumen

Objectius: Comparar la prevalença de registres dels diagnòstics més freqüents dels pacients de més de 80 anys atesos en cadascuna de les 3 consultes d'un centre d'Atenció Primària

Metodologia: Treball observacional descriptiu. Àmbit: els pacients de més de 80 anys atesos en les 3 consultes de medicina de família d'un centre de salut. Es compara la prevalença dels registres de 25 diagnòstics diferents a partir de la història clínica. Variables: edat, sexe. Diagnòstics d'hipertensió arterial (HTA), diabetis, dislipèmia, cardiopatia isquèmica, insuficiència cardíaca, ictus, fibril·lació auricular, malaltia renal crònica (MRC), artrosi, Malaltia pulmonar obstructiva crònica/asma, incontinència urinària, obesitat, depressió, ansietat, insomni, hipotiroïdisme, Parkinson, demència, glaucoma, cataracta, hipoacúsia, tabaquisme, osteoporosi, fractura, hiperplàsia prostàtica (HBP). Mesures: percentatges y mitjanes.

Resultats: 220 pacients (77-67-76). Edats mitjanes: (85,8-84,5-84,4). Percentatge de dones (68,9-70,1-60,5%). Destaquen algunes diferències de prevalences de registres: HTA (67,5-80,6-84,2%), MRC (14,3-37,3-46,1%), artrosi (50,6-41,8-61,8%), obesitat (16,9-10,4-19,7%), ansietat (5,2-8,9-15,8%), hipotiroïdisme (3,9-13,4-2,6%), Parkinson (5,2-3-1,3%), glaucoma (15,6-10,4-11,8%), cataracta (24,7-32,8-11,8%), hipoacúsia (13-17,9-7,9%), osteoporosi (6,5-8,9-1,3%), fractures (9,1-8,9-13,1%), HBP (homes) (62,5-45-40%).

Conclusions: Les diferències de prevalences de registres són molt significatives en molts diagnòstics freqüents en les persones grans en funció dels professionals que les atenen. Aquestes diferències sovint es donen en patologies de difícil tractament o amb poc control a l'atenció primària: MRC, artrosi, obesitat, ansietat, Parkinson, glaucoma, cataracta, hipoacúsia, fractures. Probablement, hi ha una diferent sensibilitat davant de mateixes situacions que fan que el professional es decideixi o no a registrar un determinat diagnòstic.