



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 160/2747 - Tasa de respuesta y principales motivos de rechazo en la participación de la población general de Toledo en el estudio RICARTO

I. Catalán Pedraz<sup>a</sup>, E. Jiménez Catalán<sup>a</sup>, A.) Segura Fragoso<sup>b</sup>, A. Villarín Castro<sup>c</sup>, G.C. Rodríguez Roca<sup>d</sup>, L. Rodríguez Padial<sup>e</sup>, J. Hernández Moreno<sup>f</sup>, A. Menchén Herreros<sup>g</sup>, J. Fernández Martín<sup>h</sup> y F.J. Alonso Moreno<sup>i</sup>

<sup>a</sup>Enfermera del Estudio RICARTO. Gerencia de Atención Primaria de Toledo. <sup>b</sup>Unidad de Investigación. Instituto de Ciencias de la Salud. Toledo. <sup>c</sup>Médico de Familia. Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria. Toledo. <sup>d</sup>Médico de Familia de EAP. Servicio de Salud de Castilla La Mancha. Castilla La Mancha. <sup>e</sup>Cardiólogo. Servicio de Cardiología. Complejo Hospitalario de Toledo. Toledo. <sup>f</sup>Médico de Familia. Centro de Salud de Polán. Consultorio Local de Argés. Toledo. <sup>g</sup>Laboratorio de Análisis Clínicos. Complejo Hospitalario de Toledo. Toledo. <sup>h</sup>Jefe de Servicio de Investigación. Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM). Toledo. <sup>i</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Sillería. Toledo.

## Resumen

**Objetivos:** El estudio RICARTO (Riesgo CARDiovascular y eventos cardiovasculares en la población general del área sanitaria de Toledo) ha sido financiado por el Gobierno de Castilla-La Mancha mediante la convocatoria de Ayudas de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha a la investigación de Biomedicina y Ciencias de la Salud, nº de expediente PI- 2010/043. Objetivo: conocer la tasa de respuesta (TR) y los principales motivos de rechazo en la participación de la población general de Toledo en el estudio RICARTO.

**Metodología:** Estudio epidemiológico transversal realizado en población general de Toledo  $\geq 18$  años, aleatorizada según tarjeta sanitaria. Se analizaron TR y motivos de rechazo; variables analizadas: edad, sexo, tabaquismo y tratamiento de factores de riesgo cardiovascular (FRCV).

**Resultados:** Se analizaron 193 personas (edad media  $48,1 \pm 16,5$  años; 52,3% hombres). La TR fue 35,5%. Las mujeres fueron más respondedoras (54,8% respondedoras vs 47,7% no respondedoras;  $p = 0,09$ ). El 8,8% presentaba diabetes, 20,2% hipertensión, 16,1% dislipemia, 21,2% tabaquismo, 2,1% antecedentes de infarto de miocardio, 1,0% angor y 2,1% de ictus. No respondedores: 46,1% tenía 18-40, 25,9% 41-60 y 28%  $> 61$  años (vs 36,6%, 41,1% y 22,4% en respondedores;  $p = 0,001$ ).

**Conclusiones:** La TR es baja, siendo el grupo de 41-60 años el más participativo. El horario de trabajo/estudios es la principal causa de rechazo. Apenas hay diferencias entre respondedores y no respondedores respecto a FRCV y enfermedad cardiovascular.