



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 160/1238 - Vacunación antineumocócica conjugada (VNC-13) en un centro de salud de Madrid. Indicación, pacientes y comorbilidades

A. Cano Espín<sup>a</sup>, M. Goicoechea García<sup>b</sup>, P. Sanz Orador<sup>c</sup>, F. Barcala Muñoz<sup>d</sup>, P. Pérez Elías<sup>a</sup>, M.C. Santos Álvarez<sup>a</sup>, A. Fernández Rivera<sup>b</sup>, B. Inglés Azorín<sup>b</sup>, M.E. Calonge García<sup>a</sup> y A. Uranga Gómez<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Médico de Familia. Centro de Salud García Noblejas. Madrid. <sup>b</sup>Médico Residente 1<sup>er</sup> año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud García Noblejas. Madrid. <sup>c</sup>Enfermera. Centro de Salud García Noblejas. Madrid.

<sup>d</sup>Enfermero. Centro de Salud García Noblejas. Madrid.

### Resumen

**Objetivos:** Conocer la implicación de los profesionales y la cobertura de la vacunación administrada en un centro de salud durante un período de seis meses.

**Metodología:** Estudio descriptivo transversal. La muestra son los pacientes a los que se ha administrado la vacuna conjugada 13 valente. Se recogen las variables: edad, sexo, patología que presentan e indicación de la vacunación.

**Resultados:** El centro de salud de G<sup>a</sup> Noblejas en Madrid tiene una población de 22.853 pacientes, siendo las patologías más prevalentes: HTA (21,89%), diabetes mellitus (7,76%), cardiopatías (3,29%), EPOC, asma y dislipemias. La población mayor de 64 años es de 5.165 pacientes, de ellos, 2.159 son mayores de 80 años. Entre junio y diciembre de 2014 se han administrado en el centro 127 vacunas conjugadas por indicación preventiva. De ellas, un 29,92% se administraron en pacientes inmunodeprimidos; 27,55% en neoplasias; 14,96% en insuficiencia renal; 9,44% en enfermedades respiratorias y 6,29% en hepatopatías. Sanidad y Salud Pública de nuestro país aconsejan la vacunación a mayores de 65 años, y menores de 65 años con factores de riesgo, fundamentalmente inmunosupresión.

**Conclusiones:** La enfermedad invasiva por neumococo es una de las 10 primeras causas de muerte en países desarrollados, y es evitable con la vacunación. Su incidencia es muy alta, además, en diabetes, tabaquismo, y alcoholismo, indicaciones en las que se observa una infravacunación. Es necesaria la implicación de los profesionales sanitarios en promover la vacunación con la VNC-13 en esos pacientes.