



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 160/152 - Estrategias en Atención Primaria para mejorar la cobertura de la vacunación anti

L. Bort Llorca<sup>a</sup>, F. Antón García<sup>b</sup>, M.J. Richart Rufino<sup>b</sup>, L. Pérez Ollero<sup>a</sup>, C. Mir Sánchez<sup>c</sup>, E. Correcher Salvador<sup>d</sup>, G. Oliver Guimera<sup>e</sup> y S. Pérez López<sup>e</sup>

<sup>a</sup>Médico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Fuensanta. Valencia. <sup>b</sup>Médico de Familia. Centro de Salud de Fuensanta. Valencia. <sup>c</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Barrio de la Luz. Valencia. <sup>d</sup>Médico de Familia. Centro de Salud de Picassent. Valencia. <sup>e</sup>Médico Residente de 3º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Fuensanta. Valencia.

### Resumen

**Objetivos:** Comparar distintas estrategias para mejorar la cobertura vacuna antigripal en mayores de 64 años.

**Metodología:** Nuestro Centro de Salud (CS), informa de la vacunación antigripal mediante carteles. Se compararon las coberturas de las campañas 2010-2013 de cuatro consultas. C1: El MF había establecido una estrategia para vacunar en el mismo momento en que acudía el paciente. C2: el médico insistía sistemáticamente en la vacunación a los mayores de 64 años. C3-C4: los pacientes eran informados sólo por los carteles del CS. Se presentaron los resultados (2010-2013) en sesión clínica y se reevaluó la campaña 2014.

**Resultados:** Estas consultas atienden a un total de 1230 pacientes mayores de 64 años. Coberturas Global/C1/C2/C3/C4. 2010: 48,8%/50,4%/53,7%/47,8%/43%. (p = NS). 2011: 49,8%/50,4%/52,5%/51,2%/44,9% (p = NS). 2012: 50,2%/51,4%/53,7%/48,1%/47,5% (p = NS). 2013: 59,4%/76,1%/57,8%/53,2%/51,9 (p = 0,000 en los datos de la C1 con respecto al resto); p = NS entre C2,C3,C4). 2014: 62,7%/82,4%/66,7%/51,5%/51% (p = 0,000 en los datos de la C1 con respecto al resto y C2 con C3-C4); p = NS entre C2-C3. Comparando las coberturas 2013-2014 dentro de cada consulta hay mejoría significativa en C1 (p = 0,001); C2 (p = 0,000). Vacunados en la consulta a demanda: C1 el 25% (2013) y 27% (2014). C2 nadie en 2013 y 9% en 2014. En la C3 y C4 todas las vacunaciones por enfermería en horario preestablecido.

**Conclusiones:** La estrategia "aquí te pregunto aquí te vacuno" de la C1 ha mejorado significativamente la cobertura vacunal (2013-2014). La C2 en 2014 ha mejorado tras adoptar actitud más proactiva.