



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

160/2802 - ¿ESTÁN satisfechos con el tratamiento ANALGÉSICO los pacientes con gonalgia?

V. Peiró López^a, M. Andrés Company^a, J. Peruga Benedito^a, I. Llarío Cuquerella^a, I. López^a, Á. Alborch Ferrís^a, J. Ordiñana Sanchís^b, C. Moncho Alarcón^a, M. López Blasco^a y A. León Medina^c

^aMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. Valencia. ^bMédico Residente de 4^o año de Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. Valencia. ^cMédico Residente de 1^{er} año de Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. Valencia.

Resumen

Objetivos: Conocer el grado de satisfacción de los pacientes con diagnóstico de gonalgia crónica, con el tratamiento analgésico en el departamento Xàtiva-Ontinyent.

Metodología: Estudio observacional, descriptivo y transversal realizado en AP. La población a estudio fueron pacientes mayores de 60 años diagnosticados de gonalgia crónica, seleccionados aleatoriamente, que acuden a diferentes CS del Departamento. Los datos se obtuvieron por la historia informatizada y un test de satisfacción terapéutica de 3 preguntas mediante llamadas telefónicas. P1 ¿Ha encontrado mejoría en el dolor al tomar el medicamento? Respuesta: sí o no. P2. Qué satisfacción obtiene con el actual tratamiento para el dolor. Respuesta: 1: muy satisfecho, 2: satisfecho, 3: indiferente, 4: insatisfecho, 5: muy insatisfecho. P3. Puntúe el dolor que siente actualmente: Respuesta: 1: nada, 2: poco, 3: bastante, 4: mucho, 5: insoportable. Los análisis estadísticos se realizaron con el paquete SPSS versión 22.0.

Resultados: Se incluyeron 500 pacientes, 262 (52,4%) mujeres edad media $75,79 \pm 6,83$ años y 238 (47,6%) hombres edad media $75,38 \pm 7,29$ años. Con respecto a analgesia: 225 (45%) pacientes tienen prescrito AINEs, 69 (13,8%) pacientes toman opioides, 31 (6,2%) pacientes toman SYSADOAS; 24 (77,4%). Los AINEs más utilizados son paraaminofenoles 91 (33,8%), salicilatos 60 (22,3%), coxibes 38 (14,1%). Test de satisfacción, 181 (36,2%) pacientes contestaron la llamada. P1: No: 29 (16%), Sí: 152 (84%). P2: R1: 20 (11,1%), R2: 99 (54,6%), R3: 42 (23,2%), R4: 13 (7,2%), R5: 7 (3,9%). P3: R1: 42 (23,2%), R2: 88 (48,6%), R3: 35 (19,3%), R4: 10 (5,6%), R5: 6 (3,3%).

Conclusiones: En cuanto al grado de insatisfacción, en las 2 primeras preguntas observamos 1 de cada 3 pacientes están insatisfechos con el tratamiento del dolor en la gonalgia crónica. 1 de cada 4 pacientes sufre bastante dolor, y de estos 1 de cada 3 pacientes ve muy disminuida su calidad de vida por el dolor.