



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

160/847 - Percepción de los profesionales de Atención Primaria sobre las actuaciones realizadas en una parada cardiorrespiratoria

B. de Pablo Márquez^a, S. Moreno Escribà^b, E. Santano Rivas^c, M. Serra Gallego^a, A. Arévalo Genicio^d, S. Sánchez Quintana^e, M. Zambrana Segalés^f, D. García Font^g y D. Pedrazas López^g

^aMédico de Familia. CAP Valldoreix. Sant Cugat del Vallés. Barcelona. ^bMédico de Familia. CAP Larrard. Barcelona. ^cMédico de Familia. CAP Mataró Centre. Consorci Sanitari del Maresme. Barcelona. ^dMédico de Familia. Hospital Universitari Mutua Terrassa. Barcelona. ^eMédico Residente de 4^o año de Medicina Familiar y Comunitaria. CAP Valldoreix. Sant Cugat del Vallés. Barcelona. ^fMédico Residente de 3^{er} año de Medicina Familiar y Comunitaria. CAP Valldoreix. Sant Cugat del Vallés. Barcelona. ^gMédico de Familia. EAP Abrera. Abrera. Barcelona.

Resumen

Objetivos: Conocer la percepción de los profesionales de Atención Primaria (AP) respecto a la atención a las paradas cardiorrespiratorias (PCR) en su ámbito.

Metodología: Cuestionario de diseño propio dirigido a los profesionales de todos los estamentos de 4 centros de AP en los que se atendió una PCR en el mes anterior. Se analizaron los datos con SPSS.

Resultados: Respondieron 65 profesionales. Se interrogó sobre la ansiedad cuando atendieron la PCR en su centro y la ansiedad basal ante la posibilidad de atender una PCR en el día a día. El estamento que refirió menor ansiedad tanto antes como durante la PCR fueron los residentes. En lo que se refiere a la formación, los profesionales que refirieron más ansiedad tanto basal como durante la PCR fueron aquellos que habían realizado formación en soporte vital avanzado. Se solicitó a los profesionales que evaluaran del 1 al 10 diferentes acciones realizadas durante la PCR, siendo las peor valoradas el liderazgo y el control de tiempo.

Conclusiones: Las PCR son poco frecuentes en Atención Primaria y la posibilidad de atender ésta patología tan grave puede generar ansiedad tanto previa como durante las actuaciones. La formación previa y la categoría profesional puede hacer variar dicha percepción. Las actuaciones durante la PCR que recibieron peor evaluación fueron el liderazgo y el control del tiempo, debido a que ambos precisan de un buen manejo de las PCR para realizarlo correctamente.