



## Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

### 160/1092 - Uso de las Guías de Práctica Clínica por los Médicos/as de la Provincia de Badajoz

H.A. Correa<sup>a</sup>, P. García Ramos<sup>b</sup>, V. Sánchez Fernández<sup>c</sup>, R. Salas Gómez<sup>d</sup>, M. García Rivas<sup>e</sup>, S.E. Saracco<sup>f</sup> y S. Banda Ramírez<sup>g</sup>

<sup>a</sup>Médico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Don Benito Oeste. Badajoz.

<sup>b</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Don Benito Oeste. Don Benito. Badajoz. <sup>c</sup>Médico Residente de 3º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Don Benito Oeste. Badajoz. <sup>d</sup>Médico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Don Benito Este. Badajoz. <sup>e</sup>Médico Residente de 1º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Don Benito Oeste. Badajoz. <sup>f</sup>Licenciada en Medicina.

<sup>g</sup>Estudiante 4º año de Medicina. Universidad de Extremadura.

### Resumen

**Objetivos:** Las Guías de Práctica Clínica (GPC) son directrices elaboradas sistemáticamente para asistir a los médicos y a los pacientes en la toma de decisiones sobre la atención sanitaria adecuada. Está demostrado que la correcta utilización mejora la eficacia de las actuaciones médicas. Se desea: conocer el porcentaje de médicos que utilizan habitualmente las GPC en el área de la Provincia de Badajoz, motivos por los que lo hacen, el tipo de GPC que emplean y su uso, opinión sobre su utilidad.

**Metodología:** Realizamos un estudio observacional descriptivo transversal, a partir de una encuesta remitida a los médicos cogidos al azar, siendo la misma voluntaria y anónima, resultando un muestreo aleatorio no estratificado. Se utilizó un cuestionario validado, semiestructurado, compuesto de 14 preguntas de valoración y una pregunta abierta, referidas al uso de las GPC en la actividad laboral diaria en su área. Las preguntas con variable de escala ordinal se estratificaron en 5 categorías nada/nunca, poco, bastante, mucho, siempre/totalmente. Se tomaron como datos significativos los dos porcentajes mayores en cada pregunta.

**Resultados:** 70% de los que contestaron usan habitualmente GPC en su actividad clínica diaria. 86% la usan para mejorar la asistencia. 84% consideran que su uso disminuye la variabilidad de la práctica clínica.

**Conclusiones:** Como resultado surge que es necesario mayor difusión y uniformidad en el uso de las GPC, debiendo ser promovido su uso desde la Gerencia.