



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 160/1570 - La Disfagia, el síntoma silencioso

D. Ramírez Tarruella<sup>a</sup>, P. Guirado Vila<sup>b</sup>, S. Porcuna Alférez<sup>c</sup>, M.Á. Fernández Balmón<sup>c</sup>, M.M. Vázquez Archilla<sup>c</sup>, J. Domínguez Carmona<sup>c</sup>, J. Bertran Culla<sup>b</sup>, M.R. Vicente Fernández<sup>d</sup> y M.E. Coll Vidal<sup>e</sup>

<sup>a</sup>Médico de Familia. Técnica de Salut. DAP Costa de Ponent. Barcelona. <sup>b</sup>Médico de Familia. Unitat d'Atenció Crònica Complexa. UTACC. Baix Llobregat Nord. Barcelona. <sup>c</sup>Diplomada de Enfermeria. UTACC. Baix Llobregat Nord. Barcelona. <sup>d</sup>Médico de Familia. CAP Sant Andreu. Barcelona. <sup>e</sup>Médico de Familia. CAP Torrelles Llobregat. Barcelona.

## Resumen

**Objetivos:** Cuantificar la prevalencia de las patologías que más comúnmente se relacionan con la disfagia en la población mayor de 15 años en nuestro medio: Parkinson, AVC, ELA y neumonía aspirativa.

**Metodología:** Obtenemos datos anonimizados de las historias clínicas electrónicas de todos los pacientes con diagnósticos de disfagia atendidos del territorio Baix Llobregat Nord, mayores de 15 años, entre el 1 de enero de 2014 y 31 de diciembre 2014.

**Resultados:** 1. Para cada área básica de salud, mostramos la distribución de las siguientes patologías: demencia, Parkinson y AVC. Existe sólo un caso registrado de ELA y cuatro casos de neumonía aspirativa. 2. Para el total de los pacientes diagnosticados de disfagia analizamos los que presentan las patologías que con más prevalencia se acompañan de disfagia según la literatura. 3. Para el total de los pacientes diagnosticados de disfagia analizamos los que presentan las patologías que con más prevalencia se acompañan de disfagia según la literatura.

**Conclusiones:** En anteriores estudios hemos detectado un bajo registro de disfagia en nuestro territorio comparado con la literatura actual. Pese a que estudios previos describen una alta prevalencia de Parkinson, AVC y demencia en pacientes con disfagia, nos sorprende que en nuestro territorio el 82% de los pacientes registrados con disfagia no presenten registro de estas enfermedades. Posteriores estudios deberían dirigirse a confirmar si el patrón de disfagia difiere en nuestro territorio o existe un problema de registro.