



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

160/1126 - Abordaje de la Adherencia en Diabetes Mellitus tipo 2: Situación actual y propuesta de posibles soluciones

J.J. Mediavilla Bravo^a, S. Artola^b, P. Conthe^c, M. Mata Cases^d, C. Miranda Fernández-Santos^e y D. Orozco Beltrán^f

^aCentro de Salud Burgos Rural. ^bCentro de Salud José Marv. ^cHospital Gregorio Maraon. Servicio de Medicina Interna, Madrid. ^dCentro de Salud La Mina. Sant Adri del Bess. Barcelona. ^eCentro de Salud Buenavista. Toledo. ^fMdico de Familia. Centro de Salud Cabo Huertas. Alicante. Unidad Investigacin. Departamento San Juan de Alicante. Alicante.

Resumen

Objetivos: Definir el impacto y las causas de la falta de adherencia teraputica en los pacientes con DM2, las posibles intervenciones para mejorarla y el papel de las distintas partes implicadas.

Metodologa: Estudio realizado por mdicos de Atencin Primaria con experiencia en diabetes. Siguiendo la metodologa Delphi, se valor el grado de acuerdo a travs de una escala Likert de 9 puntos mediante un cuestionario estructurado de 131 tems en 4 bloques: Impacto; Causas de incumplimiento; Diagnstico de la falta de adherencia, intervenciones para mejorar la adherencia.

Resultados: Participacin del 76,31%, se consensuaron 110 aseveraciones (84%), 102 tems (77,9%) en acuerdo y 8 (6,1%) en desacuerdo. El incumplimiento teraputico constituye un problema sanitario que afecta directamente a los pacientes, independientemente de su edad y su situacin clnica. Los mtodos de medicin indirecta de adherencia como los test de Hayness-Sackett y Morisky-Green, junto con la informacin de receta electrnica y dispensacin farmacutica, son los ms utilizados en los pacientes con DM2. La educacin del paciente es un factor clave. Facilitar asesoramiento por parte de una enfermera, fomentar el papel del farmacutico, materiales educativos, recordatorios en el mvil para disminuir el nmero de olvidos, o programas a travs de un contact center supervisados por el personal sanitario han demostrado ser eficaces para mejorar la adherencia teraputica.

Conclusiones: La falta de adherencia en los pacientes con DM2 dificulta lograr el control teraputico. La formacin especfica y el disponer de los recursos necesarios en la consulta es esencial para minimizar el impacto de la falta de cumplimiento teraputico.