



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 160/167 - ANCIANOS DIABÉTICOS Y SU CONTROL LIPÍDICO

C. Manzanares Arnáiz<sup>a</sup>, F. Gómez Molleda<sup>b</sup>, B. del Ribero Sierra<sup>b</sup>, M. Hierro Cámara<sup>c</sup>, E.M. Vega Cubillo<sup>d</sup>, B. Ganza González<sup>e</sup>, A.I. Ortiz Blanco<sup>f</sup>, X. Piris García<sup>g</sup>, A. Vázquez Sánchez<sup>h</sup> y R.V. Alain Mbesseke<sup>i</sup>

<sup>a</sup>Médico de Familia. Servicio de Urgencias Centro de Salud Santoña. Cantabria. <sup>b</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Ramales. Cantabria. <sup>c</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Cotolino. Castro Urdiales. Cantabria. <sup>d</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Colindres. Colindres. <sup>e</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Santoña. Santoña. <sup>f</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Besaya. Los Corrales. Cantabria. <sup>g</sup>Médico Residente de 3<sup>er</sup> año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Cotolino I. Castro Urdiales. <sup>h</sup>Médico de Familia sustituta. <sup>i</sup>Médico Residente de 1<sup>er</sup> año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Cotolino II. Castro Urdiales.

### Resumen

**Objetivos:** Estudiar el perfil lipídico de los diabéticos de más de 80 años de un cupo de Atención Primaria. Ver si cumplen criterios de buen control.

**Metodología:** Estudio descriptivo, a partir de la historia clínica informatizada en Atención Primaria (OMI-AP). Se revisan datos analíticos durante 2 años, de los pacientes que tienen activo el episodio diabetes mellitus. Se analizan las cifras de colesterol total y LDL colesterol.

**Resultados:** Partimos de un cupo de 1.260 pacientes, en el que independientemente de la edad, el 9,33% son diabéticos. Al ajustar muestra a objetivos, vemos que la cifra de diabéticos asciende al 15,41% ya que en el cupo hay 188 pacientes mayores de 80 años y 29 son diabéticos. El 60% tiene un colesterol total inferior a 200 mg/dl y el 58,4% tiene el LDL-colesterol menor de 100 mg/dl. Los pacientes de muy alto riesgo cardiovascular poseen un LDL-colesterol inferior a 70 mg/dl en el 100% de los pacientes. De todos los pacientes a estudio, diabetes mayores de 80 años, sólo encontramos 1 paciente que no acepta ninguno de los 3 pilares de tratamiento de la diabetes, no realiza alimentación pobre en grasas y con control de la ingesta de carbohidratos, no realiza ejercicio diario ni cumple con el tratamiento farmacológico.

**Conclusiones:** Más del 50% de los pacientes a estudio cumplen criterios de buen control de su perfil lipídico. Sólo un paciente no acepta medidas higiénico-dietéticas, ejercicio regular ni tratamiento farmacológico, el resto acepta tratamientos, con distintos grados de cumplimiento.