Semergen. 2015;41 (Espec Congr):1020

Medicina de Familia. SEMERGEN

https://www.elsevier.es/semergen

160/1405 - CONSUMO DE FÁRMACOS HIPOGLUCEMIANTES INSULÍNICOS EN MÁLAGA

L. Ruíz del Moral[a], M.I. Luna Moreno[a], M. Pérez Castro[b], L. Muñoz González[c], Á. Camarena Herrera[d], R. Reina González[d], M. Gutiérrez Jansen[e] y M.R. Sánchez Pérez[f]

[a]Médico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ciudad Jardín. Málaga. [b]Médico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ciudad Jardín. Málaga. [c]Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ciudad Jardín. Guadalmedina. Málaga. [d]Médico Residente de 3er año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ciudad Jardín. Málaga. [e]Médico Residente de 1er año de Medicina Familiar. Centro de Salud Ciudad Jardín. Málaga. [f]Médico de Familia. Centro de Salud Ciudad Jardín. Málaga.

Resumen

Objetivos: Analizar la utilización de fármacos hipoglucemiantes insulínicos en el Distrito Sanitario (DS) Málaga-Guadalhorce durante el año 2014.

Metodología: Estudio descriptivo transversal. Atención Primaria. La población mayor de 18 años del DS fue de 604312 personas, 315.337 (52,2%) mujeres. Tenían diagnóstico de diabetes 49.584 personas, de las que 25.160 (50,7%) eran hombres. Subgrupo terapéutico "A10 (Fármacos usados en diabetes)". Se diferencian cuatro grupos de tipos de insulinas (prolongadas, rápidas, intermedias y mixtas) Los datos se presentan como dosis diaria definida (DDD)/1000 habitantes y día siguiendo la descripción de la OMS. Año 2014. Medidas de frecuencia.

Resultados: Durante el año 2014 se utilizaron 14.537.896 DDD de fármacos hipoglucemiantes, de los que 4.023.607 (27,67%) fueron insulinas. Las prolongadas (40%) fueron las insulinas más utilizadas, seguidas de las mixtas (32%), rápidas (17%) e intermedias (11%). Dentro de las prolongadas glargina supuso el 73%. La insulina mixta más usada fue la asparta/asparta protamina con el 52%, seguida de lispro/lispro protamina con el 31%. Asparta (54%) y lispro (34%) fueron las insulinas rápidas que más que se utilizaron. La isofánica humana con el 87% fue la insulina más consumida dentro de las intermedias.

Conclusiones: Baja utilización de insulinas. Las insulinas prolongadas son las insulinas más utilizadas en Málaga, con predominio de glargina. Elevado consumo de insulinas mixtas.

1138-3593 / © 2015 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.