



160/1460 - INGRESOS HOSPITALARIOS DE UNA POBLACIÓN EPOC DIABÉTICA VERSUS NO DIABÉTICA

S. Llano Pajares^a, J. Iturralde Iriso^b, M. López Miralles^a, G. Mediavilla Tris^c, I. Calvo López^d, A. de Azaola Arias^a, M. Monje de Velasco^e, M. Echevarría Díez^f, C. de la Portilla Sánchez^g y M. Cortes Martínez^h

^aMédico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Zalbalgana. Vitoria-Gasteiz. Álava. ^bMédico de Familia. Centro de Salud Casco Viejo. Vitoria-Gasteiz. Álava. ^cMédico de Familia. Centro de Salud Arambizcarra I. Vitoria-Gasteiz. ^dMédico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Zaramaga. Vitoria. ^eMédico Residente de 3º año. Centro de Salud Olarizu. Vitoria-Gasteiz. ^fMédico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Sansomendi. Vitoria-Gasteiz. Álava. ^gMédico Residente de 4º año. Centro de Salud Zalbalgana. Vitoria-Gasteiz. Álava. ^hMédico de Familia. Servicio de Urgencias HUA. Vitoria-Gasteiz.

Resumen

Objetivos: El objetivo de nuestro estudio es conocer la influencia de ser diabético en nuestra población diagnosticada de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en relación a los ingresos hospitalarios o asistencia a urgencias en el último año.

Metodología: Estudio descriptivo transversal. Se recogen los datos a través del programa OSABIDE, de una muestra de pacientes EPOC de 5 centros de salud de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

Resultados: La muestra son 621 personas. La edad media es de $68,3 \pm 11,88$ años El 77,29% son hombres. El 21,74% son diabéticos. Un 49,60% son hipertensos arteriales. La media de años de diagnóstico de su EPOC son $8,17 \pm 5,5$ años. Si comparamos los ingresos por reagudización de su EPOC no hay diferencias significativas ($p = 0,62$) entre los 2 grupos. Si comparamos los ingresos por cualquier causa, hay mayor número de ingresos en el grupo de diabéticos aunque no de manera significativa ($p = 0,27$). Tampoco existen diferencias en el número de asistencias a urgencias hospitalarias ($p = 0,94$).

Conclusiones: No hay diferencias entre nuestros pacientes EPOC si tienen diabetes, en relación a sus ingresos hospitalarios o asistencia a urgencias, por lo que pueden ser otras variables las que influyan en el mayor ingreso de estos pacientes.