



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 160/837 - EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DISCAPACIDAD EN PACIENTES CON FIBROMIALGIA UTILIZANDO EL WORLD HEALTH ORGANIZATION DISABILITY ASSESSMENT SCHEDULE II (WHODAS II)

B.Casanueva Fernández<sup>a</sup>, R. Belenguer Prieto<sup>b</sup>, R.M. Martín González<sup>c</sup>, R. Sánchez Villar<sup>d</sup>, Á. Pérez Martín<sup>e</sup>, B.Rodero Fernández<sup>f</sup>, S. Herrera Castañedo<sup>g</sup>, J.L. Vázquez Barquero<sup>h</sup> y M.Á. González-Gay Mantecón<sup>i</sup>

<sup>a</sup>Médico de Familia y Reumatólogo. Centro de Especialidades de Cantabria Idival. Santander. Cantabria. <sup>b</sup>Médico de Familia y Reumatólogo. Centro de Salud de Algemesí. Valencia. <sup>c</sup>Médico de Familia. Consulta Privada Dra. Martín. Valencia. <sup>d</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Zapatón. Cantabria. <sup>e</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Isabel II. Santander. Cantabria. <sup>f</sup>Psicólogo. Centro de Salud Rodero. Santander. Cantabria. <sup>g</sup>Psicóloga. Hospital Marqués de Valdecilla. Santander. Cantabria. <sup>h</sup>Psiquiatra. Hospital Marqués de Valdecilla. Santander. Cantabria. <sup>i</sup>Reumatólogo. Hospital Marqués de Valdecilla. Idival. Santander. Cantabria.

### Resumen

**Objetivos:** Evaluar el grado de discapacidad y las propiedades psicométricas del World Health Organization Disability Assessment Schedule II (WHO-DAS II) en una amplia muestra de pacientes con fibromialgia (FM).

**Metodología:** Se incluyeron 200 pacientes diagnosticados consecutivamente de FM aplicando criterios ACR de 1990. La evaluación clínica incluía la aplicación en dos ocasiones y por entrevistadores diferentes, separadas por un lapso de 6 días, del cuestionario WHO-DAS II, un instrumento heteroaplicado para la valoración del funcionamiento y la discapacidad, que evalúa el funcionamiento diario en seis áreas de actividad, en un marco de referencia temporal de 30 días.

**Resultados:** Los niveles de mayor discapacidad aparecen en el dominio "Actividad doméstica y laboral" (media 85,27) seguida del dominio "Movilidad" (media 69,64). Los dominios "Cuidado personal" (media 42,23) y "Relaciones interpersonales" (media 48,27) son los que reflejan menor nivel de discapacidad. "Participación social" (media 62,58) y "Comprensión/comunicación" (media 60,56) se encuentran entre los valores de mayor y menor discapacidad. La puntuación global resulta de 61,23, lo que traduce un nivel de discapacidad medio-alto. El coeficiente de correlación de Pearson es de 0,805, y el coeficiente de correlación intraclase de 0,802, con unos intervalos de confianza al 95% de (0,73 -0,85), cifras de fiabilidad test-retest muy altas. El alfa de Cronbach resulta de 0,936, reflejando unos índices de consistencia interna muy buenos.

**Conclusiones:** La versión española del WHO-DAS II muestra propiedades psicométricas apropiadas y puede utilizarse para evaluar discapacidad en la práctica clínica, indicando un grado severo de discapacidad en pacientes con FM.