Semergen. 2015;41 (Espec Congr):98

Medicina de Familia. SEMERGEN

https://www.elsevier.es/semergen

# 160/2684 - EVALUACIÓN DE PROGRAMA DE SINTROM EN CENTRO DE SALUD

*A. Marcelo Martínez[a] y M.R. Garratón Juliá[b]*

*[a]Médico de Familia. Centro de Salud Pinillo Chico. El Puerto de Santa María. Cádiz. [b]Médico de Familia. Centro de Salud Dr. Joaquín Pece. San Fernando. Cádiz.*

## Resumen

**Objetivos:** Realizar una evaluación del Programa TAO (tratamiento anticoagulante oral) en un centro de salud urbano, para determinar el porcentaje de pacientes con INR en rango terapéutico.

**Metodología:** Estudio descriptivo transversal del programa TAO, se han recogido los datos de los pacientes en la consulta de TAO durante un mes que tuvieran al menos 4 registros de INR. Se calcula el porcentaje pacientes con INR en rango mayor o igual al 60% y al 66% tanto por el método Rosendaal como por el método de Determinaciones. Se eliminaron aquellos que no tenían al menos 4 controles de INR.

**Resultados:** En total se han recogido 168 pacientes, los valores de INR, se encuentran por encima del 60% en el 61.5% de los pacientes. Según el método Rosendaal, cumplen el objetivo (≥ 66%) el 47,02%, Según el modelo de las Determinaciones, cumplen este objetivo el 33,93%. La indicación más frecuente es la fibrilación auricular en el 62,5% de los casos. El rango de edad varía desde los 25 hasta los 91 años.

**Conclusiones:** En nuestro centro el control de INR es similar al encontrado en otos estudios nacionales y extranjeros, pero según el modelo que utilicemos para el cálculo hemos encontrados diferencias en los resultados y existe un margen de mejora en el programa TAO, teniendo la aparición de los nuevos anticoagulantes orales, sería motivo para valorar la indicación y criterios de uso de los mismo en aquellos pacientes que presentan un mal control.

1138-3593 / © 2015 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.