



160/2694 - Diferencias de tensión arterial sistólica entre ambos brazos con OMRON M6 y VaSera en personas con riesgo cardiovascular intermedio

L. Íñigo Sánchez^a, M. Santana Oteiza^b, F. Rigo Carratalá^c, G. Frontera Juan^d, P. Tamargo García^e, C. Pérez Fonseca^b y J. Mudrychová^f

^aMédico Residente de 4º año. Centro de Salud Sant Agustí. Palma de Mallorca. ^bMédico Residente de 2º año. Centro de Salud Sant Agustí. Palma de Mallorca. ^cMédico de Familia. Centro de Salud Sant Agustí. Palma de Mallorca. ^dMédico. Unidad de Investigación. Hospital Universitari Son Espases. ^eMédico Residente de 1º año. Centro de Salud Sant Agustí. Palma de Mallorca. ^fMédico Residente de 3º año. Centro de Salud Sant Agustí. Palma de Mallorca.

Resumen

Objetivos: Calcular diferencias de tensión arterial sistólica (TAS) entre ambos brazos en sujetos con riesgo cardiovascular (RCV) intermedio sin antecedentes de ECV utilizando OMRON M6 en reposo y VaSera en reposo y tras realizar ejercicio.

Metodología: Descriptivo anidado en estudio de cohortes. Muestra: 400 pacientes seleccionados aleatoriamente, que cumplieran las siguientes características: Centro de Salud Sant Agustí, edad entre 35 y 74 años, RCV intermedio, sin antecedentes de ECV. Mediciones: Tras 15 minutos de reposo se realizaron tres tomas de tensión arterial en ambos brazos, separadas de 2 minutos, con OMRON M6. Posteriormente se realizó la medición con VaSera en ambos brazos, antes y tras la realización de ejercicio de intensidad moderada.

Resultados: Con OMRON M6 se encontraron diferencias (IC95%) de TAS \geq 10 mmHg en el 13,3% (10,1-16,7%) y diferencias de TAS \geq 15 mmHg en el 3,3% (1,6-5,1%). Tras la medición con VaSera en reposo se encontraron diferencias de TAS \geq 10 mmHg en el 24,8% (16,6-34,4) y diferencias de TAS \geq 15 mmHg en el 6,5% (1,6-11,3). Tras ejercicio, con VaSera se encontraron diferencias de TAS \geq 10 mmHg en el 23,3% (15,3-32,8) y diferencias de TAS \geq 15 mmHg en el 8,3% (3,6-15,6).

Conclusiones: Algunos sujetos con RCV intermedio presentan diferencias de TAS $>$ 10 mmHg entre ambos brazos tras realizar la medición con OMRON M6. Con VaSera, casi 1 de cada 4 sujetos presentan diferencias de TAS $>$ 10 mmHg (tanto en reposo como tras ejercicio).