

## Medicina de Familia. SEMERGEN



https://www.elsevier.es/semergen

## 160/1364 - Monitorización ambulatoria de la presión arterial en las oficinas de farmacia. ¿quÉ opina atención primaria? Proyecto Farmapres-CV

A. Lorente Canoves<sup>a</sup>, F.J. Sanz García<sup>b</sup>, M. Serra Labrador<sup>c</sup>, M. Reig Botella<sup>d</sup>, V. Giner Galván<sup>e</sup>, J.J. Tamarit García<sup>f</sup>, F. Valls Roca<sup>g</sup>, V. Pallarés Carratalá<sup>h</sup>, B. Roig Espert<sup>i</sup> y M. Reig Botella<sup>f</sup>

"Médico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Cocentaina. Alicante.

bMédico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud La Fábrica. Alcoy. Alicante.

cMédico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Cocentaina. Alicante.

dServicio de Medicina Interna. Hospital General Universitario. Valencia. Médico Adjunto. Departamento
Medicina Interna. Hospital Virgen de los Lirios. Alcoy. Alicante. Servicio de Medicina Interna. Hospital General
Universitario. Valencia. Médico de Familia. Centro de Salud Benigànim. Benigànim. Valencia. Médico de
Familia. Unión de Mutuas. Castellón. Unidad de HTA. Servicio de Medicina Interna. Hospital de Manises.
Valencia.

## Resumen

**Objetivos:** Opinión de Atención Primaria sobre la potencial realización de registros MAPA en Oficinas de Farmacia Comunitaria (OFc) como vía para implementar su uso y trabajar de forma coordinada.

**Metodología:** Encuesta estructurada, 12 preguntas con respuesta semicerrada dirigida a médicos y enfermeros de los 250 Centros de Salud de la Comunidad Valenciana.

Resultados: 952 profesionales de 16 de los 24 Departamentos, emplazados en 140 CS, provincia de Valencia (44,7%), Castellón (29,6%) y Alicante (24,5%). La mayoría facultativos (63,1%), de género femenino (50,8%) y (media ± DE) 20,9 ± 10,0 años de experiencia profesional. ¿Consideraría usted adecuada la realización de MAPA en las OFc? "Sí" un 52,7%, "No" 47,1% y "No sé" 0,1%. Castellón respondió negativamente en mayor porcentaje (57,8%), Alicante (45,1%) y Valencia (41,9%) (p < 0,0001), al igual que Enfermería (58,0%) respecto Medicina (41,1%) (p < 0,0001). 16 motivos por no considerar adecuada MAPA en OFc: "La medida de la PA debe ser siempre en un CS u hospital" (31,1%), "Hay intereses económicos" (21,1%) y "Desconfianza en la metodología de medición aplicada" (13,8%). Un 58% sí remitirían a pacientes para realización de MAPA a las OFc y 2,1 "Lo haría tras formación en MAPA". Motivos principales por los que no se remitiría pacientes desde los CS para obtener MAPA de las OFc: "La OFc no es un CS" (25,6%), "AMPA es más fiable" (14,8%) y "Es responsabilidad del Médico" (11,8%).

**Conclusiones:** No existe claro posicionamiento de Atención Primaria respecto a la posibilidad de realizar MAPA en OFc. Más en contra, el colectivo femenino, de enfermería y con mayor experiencia.

1138-3593 / © 2015 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.