



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 160/1422 - USO DE ANTICOLINÉRGICOS INHALADOS EN UNA POBLACIÓN EPOC

M. López Miralles<sup>a</sup>, I. López de Viñaspre Muguerza<sup>b</sup>, J. Iturralde Iriso<sup>c</sup>, G. Mediavilla Tris<sup>d</sup>, A. de Azaola Arias<sup>a</sup>, S. Llano Pajares<sup>a</sup>, L. Lanzagorta Ovelleiro<sup>e</sup>, I. de la Cruz Couto<sup>f</sup>, S. del Amo Cachán<sup>g</sup> y B. López Alonso<sup>h</sup>

<sup>a</sup>Médico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Zalalgana. Vitoria-Gasteiz. Álava. <sup>b</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Zalalgana. Vitoria-Gasteiz. Álava. <sup>c</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Casco Viejo. Vitoria-Gasteiz. Álava. <sup>d</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Arambizcarra I. Vitoria-Gasteiz. Álava. <sup>e</sup>Médico Residente de 3º año. Centro de Salud Olarizu. Vitoria-Gasteiz. Álava. <sup>f</sup>Médico Residente de 3º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Comarca Araba. Vitoria-Gasteiz. Álava. <sup>g</sup>Médico del Servicio de Urgencias. HUA Txagorritxu. Vitoria-Gasteiz. Álava. <sup>h</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Zaramaga. Vitoria-Gasteiz. Álava.

### Resumen

**Objetivos:** El objetivo de nuestro estudio es conocer como es el uso de fármacos anticolinérgicos inhalados en una población diagnosticada de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

**Metodología:** Estudio descriptivo transversal. Se recogen los datos a través del programa OSABIDE, de una muestra de pacientes EPOC de 5 centros de salud de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

**Resultados:** La muestra son 621 personas. La edad media es de  $68,3 \pm 11,88$  años El 77,29% son hombres. Son fumadores el 34,4%, el 42,03% son exfumadores y el 23,03% no fumadores según se recoge en su historia clínica informatizada. En relación al uso de anticolinérgicos el 65,86% no los utiliza. De los que lo utilizan el 82,5% utiliza bromuro de tiotropio (BT), el 14,6% bromuro de ipatropio (BI) y el 2,9% bromuro de aclidinio (BA). De los pacientes que utilizan únicamente como broncodilatador un anticolinérgico, el 83,33% utiliza BT, el 13,64% BI y el 3,03% BA.

**Conclusiones:** Entre nuestros pacientes no hay gran utilización de anticolinérgicos, aunque con la comercialización posterior de nuevos fármacos de esta familia, puede que esta tendencia cambie a un aumento de utilización de este tipo de fármacos.