



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 160/2799 - Seguimiento del perfil FARMACOLÓGICO en pacientes con diagnóstico de DISFUNCIÓN psicosexual en el departamento Xàtiva-ontinyent entre los años 2014 y 2015

A. Cuquerella Senabre<sup>a</sup>, J. Ordiñana Sanchís<sup>b</sup>, Y.A. Silvero<sup>c</sup>, A. Lombardi<sup>d</sup>, M. López Blasco<sup>a</sup>, I. López<sup>a</sup>, I. Llario Cuquerella<sup>a</sup>, A. León Medina<sup>e</sup>, C. Moncho Alarcón<sup>a</sup> y P. Geraldo Pérez<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. Valencia. <sup>b</sup>Médico Residente de 4<sup>o</sup> año de Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. Valencia. <sup>c</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Ingeniero Joaquín Benlloch. Valencia. <sup>d</sup>Médico de Urgencias. Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. Valencia. <sup>e</sup>Médico Residente de 1<sup>er</sup> año de Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. Valencia.

### Resumen

**Objetivos:** Comparar el tratamiento farmacológico de pacientes con disfunción psicosexual (DP) en el Departamento de Xàtiva-Ontinyent durante 2 años.

**Metodología:** Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo realizado en AP. La población a estudio fue un muestreo de pacientes adultos diagnosticados de disfunción psicosexual pertenecientes a diferentes centros de AP del departamento, durante los periodos de julio 2013 a julio 2015. Los datos se obtuvieron por acceso a historia informatizada. Los análisis estadísticos se realizaron con el SPSS versión 22.0.

**Resultados:** El primer año se incluyeron 330 pacientes y el segundo 400 con DP. En el primer año la edad media fue  $45,78 \pm 10,48$  años, 318 (96,4%) son hombres edad  $46,00 \pm 10,34$  años y 12 (3,6%) mujeres edad  $39,27 \pm 12,84$  años. 139 (42,12%) pacientes tienen prescripción farmacológica, (40,98%) benzodicepinas, (19,26%) ISRS, (10,25%) tiazidas, (7,38%) fibratos, (5,74%) calcioantagonistas, (5,74%) betabloqueantes y (2,87%) alfabloqueantes. El segundo año, edad media  $49,24 \pm 11,02$  años, 383 (95,4%) son hombres edad  $49,64 \pm 14,46$  años y 17 (4,6%) mujeres edad  $40,29 \pm 14,46$  años. 191 (47,8%) pacientes tienen prescripción farmacológica, (25,25%) benzodicepinas, (11%) ISRS, (1,75%) tiazidas, (0,3%) fibratos, (1,5%) calcioantagonistas, (4,8%) betabloqueantes y (0,8%) alfabloqueantes.

**Conclusiones:** Los fármacos más utilizados son BZD y ISRS, aunque se observa una disminución en el segundo año, además de los demás medicamentos que pueden producir disfunciones psicosexuales. Sin embargo es necesario un seguimiento y control de dichos pacientes, ya que no podemos descartar que al tratar una patología, estamos creando otra de igual o mayor importancia en el paciente.