



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

160/2799 - SEGUIMIENTO DEL PERFIL FARMACOLÓGICO EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE DISFUNCIÓN PSICOSEXUAL EN EL DEPARTAMENTO XÀTIVA-ONTINYENT ENTRE LOS AÑOS 2014 Y 2015

A. Cuquerella Senabre^a, J. Ordiñana Sanchís^b, Y.A. Silvero^c, A. Lombardi^d, M. López Blasco^a, I. López^a, I. Llarío Cuquerella^a, A. León Medina^e, C. Moncho Alarcón^a y P. Geraldo Pérez^a

^aMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. Valencia. ^bMédico Residente de 4^o año de Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. Valencia. ^cMédico de Familia. Centro de Salud Ingeniero Joaquín Benlloch. Valencia. ^dMédico de Urgencias. Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. Valencia. ^eMédico Residente de 1^{er} año de Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Lluís Alcanyís. Xàtiva. Valencia.

Resumen

Objetivos: Comparar el tratamiento farmacológico de pacientes con disfunción psicosexual (DP) en el Departamento de Xàtiva-Ontinyent durante 2 años.

Metodología: Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo realizado en AP. La población a estudio fue un muestreo de pacientes adultos diagnosticados de disfunción psicosexual pertenecientes a diferentes centros de AP del departamento, durante los periodos de julio 2013 a julio 2015. Los datos se obtuvieron por acceso a historia informatizada. Los análisis estadísticos se realizaron con el SPSS versión 22.0.

Resultados: El primer año se incluyeron 330 pacientes y el segundo 400 con DP. En el primer año la edad media fue $45,78 \pm 10,48$ años, 318 (96,4%) son hombres edad $46,00 \pm 10,34$ años y 12 (3,6%) mujeres edad $39,27 \pm 12,84$ años. 139 (42,12%) pacientes tienen prescripción farmacológica, (40,98%) benzodicepinas, (19,26%) ISRS, (10,25%) tiazidas, (7,38%) fibratos, (5,74%) calcioantagonistas, (5,74%) betabloqueantes y (2,87%) alfabloqueantes. El segundo año, edad media $49,24 \pm 11,02$ años, 383 (95,4%) son hombres edad $49,64 \pm 14,46$ años y 17 (4,6%) mujeres edad $40,29 \pm 14,46$ años. 191 (47,8%) pacientes tienen prescripción farmacológica, (25,25%) benzodicepinas, (11%) ISRS, (1,75%) tiazidas, (0,3%) fibratos, (1,5%) calcioantagonistas, (4,8%) betabloqueantes y (0,8%) alfabloqueantes.

Conclusiones: Los fármacos más utilizados son BZD y ISRS, aunque se observa una disminución en el segundo año, además de los demás medicamentos que pueden producir disfunciones psicosexuales. Sin embargo es necesario un seguimiento y control de dichos pacientes, ya que no podemos descartar que al tratar una patología, estamos creando otra de igual o mayor importancia en el paciente.