



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

160/2245 - Tabaquismo en inmigrantes en la consulta de atención primaria

M. Montes Pérez^a, M.C. Martínez Pérez^b, J. Villar Ramos^c, J. Juan Armas^d, M.T. de la Torre Ovejero^e, M. Caballero Álvarez^f, N. Otero Cabanillas^g, A. Aldama Martín^h, N. Fernández Sobredoⁱ y J.L. Cepeda Blanco^j

^aMédico Residente de 1^{er} año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud José Barros. Zona 1. Santander. ^bMédico de Familia. Centro de Salud Camargo Interior. Cantabria. ^cMédico Residente de 1^{er} año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Dávila. Zona 1. Santander. ^dMédico de Familia. Centro de Salud Camargo Costa. Santander. ^eMédico de Familia. Servicio Cántabro de Salud. Balneario Liérganes. Cantabria. ^fMédico Residente de 1^{er} año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Isabel II-Centro. Zona 1. Santander. ^gMédico Residente de 1^{er} año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud El Sardinero. Zona 1. Santander. ^hMédico Residente de 1^{er} año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Camargo Costa. Zona 1. Santander. ⁱMédico Residente de 2^o año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Las Vegas. Avilés. Asturias. ^jMédico Residente de 1^{er} año de Medicina de Familia y Comunitaria. Centro de Salud Camargo Costa. Maliaño. Santander.

Resumen

Objetivos: El hábito tabáquico presenta diferencias entre países desarrollados y en vías de desarrollo. Analizamos el consumo entre población inmigrante y autóctona en una consulta de AP con numerosa población inmigrante.

Metodología: Estudio transversal descriptivo de población inmigrante de los tres países más representados en consulta del C.S. Dobra con datos de OMI-AP. Se recogió ítem tabaquismo (Sí/No/EX/NC) en inmigrantes (n = 112) y autóctonos (n = 113).

Resultados: En los tres países de inmigrantes seleccionados: Marruecos (n = 58), Rumanía (n = 34), Rep. Dominicana (n = 30) los datos hallados por sexo son: varones fumadores: 16% inmigrantes/17% españoles. No fumadores: 39%/39%. Exfumadores: 6%/11%. NC: 37%/33%. Mujeres fumadoras: 8% inmigrantes/16% españolas. No fumadoras: 59%/45%. Exfumadoras: 3%/12%. NC: 29%/27%. Por países: destaca el 33% de varones fumadores rumanos respecto al 13% marroquíes, 17% españoles y 0% dominicanos. También el 23% de mujeres fumadoras rumanas, respecto al 16% españolas, 0% marroquíes y 5% dominicanas. La mayoría de mujeres marroquíes son no fumadoras (82%) respecto al 45% españolas y 29% rumanas.

Conclusiones: Nuestros datos se asemejan a los recogidos por la OMS en población rumana y marroquí, siendo menor en españoles y en dominicanos. El porcentaje de fumadores varones inmigrantes duplica al de las mujeres a diferencia de España que es similar. La tasa más alta de fumadores es la de varones rumanos y la más baja la de mujeres marroquíes. Con esta observación pretendemos destacar la importancia de conocer las diferencias de consumo tabáquico entre poblaciones para abordar las medidas preventivas, tratamientos de deshabituación y seguimiento de factores de riesgo más eficazmente.