



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

160/2653 - Perfil del grupo de pacientes consumidores habituales de Omeprazol de una unidad de gestión clínica de Andalucía

A.J. Alcalá Grande^a, C.Serrano Guzmán^b, L. Jiménez Muñoz^b, T. Calvo Real^b, J.M. Caballero Lanzas^b, J. Ibáñez Rivas^b, J. Guerrero Molina^c, I. Conesa Pedrosa^a, I. Criado Portero^e y C.Fajardo Contreras^b

^aMédico Residente de 3^{er} año. Centro de Salud de Rute. Córdoba. ^bMédico de Familia. Centro de Salud de Rute. Córdoba. ^cEnfermera. Centro de Salud de Rute. Córdoba.

Resumen

Objetivos: Determinar el perfil del grupo de pacientes consumidores habituales de omeprazol de una unidad de gestión clínica (UGC) de Andalucía.

Metodología: Diseño: estudio descriptivo transversal. Emplazamiento: UGC Andaluza. Población y muestra: población elegible, pacientes que estén en tratamiento continuado con omeprazol durante tres meses previos a la intervención. Población diana: pacientes que están consumiendo frecuentemente omeprazol sin indicación según guía de práctica clínica (GPC). Muestra: universo muestral. Análisis cuantitativo de las variables se realizó mediante la descripción de datos, análisis bivariante y análisis lineal multivariante.

Resultados: El número de pacientes que consumían habitualmente omeprazol en la UGC estudiado fue de 646, la edad media 68,67%, DT (5,55), el 61,3 eran mujeres, el 38,7% hombres. Hay relación significativa entre tramo de farmacia y dosis consumida postintervención (p 0,0003), dosis prescrita postintervención (0,0006), dosis consumida al inicio (0,0005) y dosis prescrita al inicio (0,0008); y relación significativa entre cupo y dosis consumida postintervención (p0,0008) y dosis prescrita al inicio (0,0033).

Conclusiones: El grupo de pacientes que consume frecuentemente omeprazol se asocia con el tramo de farmacia, siendo mayor en el de pensionistas, y con el cupo (profesional responsable de la consulta).