



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 212/3189 - CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES VACUNADOS CON VCN13 EN UN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA

C.M. Aznar Zamora<sup>a</sup>, M.C. Naranjo Ratia<sup>b</sup>, M.I. Muñoz González<sup>c</sup> y A.J. Zarallo Pérez<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria; <sup>c</sup>Médico de Familia.Unidad de Gestión Clínica Dr. Cayetano Roldán Moreno. San Fernando. Cádiz. <sup>b</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Ribera del Muelle. Puerto Real. Cádiz.

### Resumen

**Objetivos:** Definir las características de los pacientes vacunados con VNC13 en atención primaria. Conocer la incidencia anual en el año 2013, 2014 y 2015 de pacientes vacunados en nuestro centro de salud. Conocer la incidencia de neumonías, y reagudizaciones en pacientes EPOC, tras la vacunación.

**Metodología:** Estudio descriptivo sobre una muestra de pacientes mayores de 15 años vacunados con VNC13 desde el año 2013 en nuestro centro de salud. Criterios de inclusión: pacientes mayores de 15 años vacunados. Criterios de exclusión: pacientes vacunados antes de 2013.

**Resultados:** Obtenemos un total de 31 pacientes vacunados desde el 1 de enero de 2013 hasta 31 de diciembre de 2015, de los cuales: existe un predominio masculino de 61,29%, y una edad media de 55,77 años. Un 51,6% de los vacunados corresponden a pacientes EPOC, el 38,7% corresponde a pacientes inmunodeprimidos, y el 16,12% a otras causas. El 80,64% tienen patología concomitante. De estos, el 32,25% corresponden a patología cardiovascular, el 9,67% a patología oncológica y el 51,61% son otras causas en la que destacan patologías endocrinas y psiquiátricas. Existe una tasa de vacunación en nuestro centro de salud de 10.3 pacientes al año. La dispersión de la vacunación en estos tres años ha sido: 2013: 12,9%; 2014: 41,93%; 2015: 45,16%. Al año, existe una población susceptible de vacunación de 750 pacientes nuevos. El porcentaje anual de vacunados según indicación es del 1,3%. La incidencia de neumonía no invasiva tras la vacunación es de 6,45%, y de reagudización en pacientes EPOC son de 19,35% del total de vacunados.

**Conclusiones:** 1. Los pacientes adultos vacunados en nuestro centro de salud según indicación con VCN13 son varones con una edad media de 55 años de los cuales un 51% están diagnosticados de EPOC y padecen, además, de patología concomitante. 2. La vacunación frente a neumococo en nuestro centro de salud disminuye la tasa de infecciones respiratorias y neumonía por neumococo. 3. Teniendo en cuenta las indicaciones de vacunación de VCN13, existe una población susceptible de ser vacunada muy superior a la que finalmente se vacuna. 4. Existe una tendencia creciente en nuestro centro de salud al consejo y vacunación de VCN13.

**Palabras clave:** *Pneumococcal vaccines. Pulmonary disease. Chronic obstructive. Diabetes mellitus. Acquired immunodeficiency syndrome.*

1138-3593 / © 2016 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.