



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

212/1523 - Neoplasia oculta en dispepsia funcional refractaria a tratamiento

T. Ortega Gómez-Alfárez^a, M.I. Arias de Saavedra Criado^b y M. Basterra Montero^c

^aMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Porzuna. Ciudad Real. ^bMédico de Familia. Centro de Salud Virgen de la Capilla. Jaén. ^cMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Federico del Castillo. Jaén.

Resumen

Descripción del caso: Paciente varón 60 años, antecedentes familiares de padre con cáncer gástrico. Acude siempre para prescripción de fármacos de médicos privados. Intentamos realizarle analítica y ecografía de abdomen. Se niega y nos muestra informe de especialistas privados con ecografía y colonoscopia de reciente realización en el que le diagnostican dispepsia gástrica funcional. En tratamiento con otilonio bromuro/8h y omeprazol 20 mg/8h. Al año vuelve por el mismo motivo y acepta analítica, ecografía de abdomen y derivación a digestivo de nuestro hospital para repetir estudio. Antes de completar la batería de pruebas debuta con hemorragia digestiva alta no autolimitada que precisa ingreso en Urgencias de nuestro hospital.

Exploración y pruebas complementarias: Exploración abdominal sin hallazgos. Hematimetría con anemia normocítica en rango transfusional. Ecografía de abdomen: refuerzo de paredes gástricas y LOES hepáticas. TAC de abdomen: engrosamiento de pared de fundus gástrico y múltiples metástasis hepáticas. Gastroscoopia: se corrige hemorragia. Se programa nueva gastroscoopia para toma de biopsias. Se ingresa para completar estadiaje, continuar con tratamiento médico y estabilización del paciente.

Juicio clínico: Adenocarcinoma infiltrante de patrón intestinal en unión esófago gástrica.

Diagnóstico diferencial: Dispepsia funcional, síndrome de colon irritable, enfermedad por reflujo gastroesofágico.

Comentario final: Tratamiento: Suplementos nutricionales (caquexia), dexametasona, metamizol, paracetamol, lorazepam, zolpidem, alopurinol, cinitaprida, bemiparina, gabapentina, lactulosa, pantoprazol, oxicodona/naloxona, paracetamol y quimioterapia (4º ciclo) adyuvante sin respuesta tumoral. Evolución: Paciente en cuidados paliativos. Insiste en continuar tratamiento por sanidad privada. Acude para recetas él o algún familiar. Lo visitamos programadamente en su domicilio. Conclusiones (y aplicabilidad para la medicina de familia) La captación activa de pacientes no adheridos a los programas de salud debe ser nuestro objetivo primordial. Casos como éste pueden ser evitados, y la mala evolución debe despertar nuestras sospechas. La promoción de la salud y la prevención primaria debe ser nuestra motivación.

Bibliografía

1. Espinás Boquet J, et al, coords. Guía de actuación en Atención Primaria, 4ª ed. Barcelona: Sociedad Española de Medicina, 2011.

Palabras clave: *Dispepsia. Síndrome de colon irritable. Pseudoobstrucción intestinal.*