



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

212/428 - LA VACUNACIÓN DE LA GRIPE EN EMBARAZADAS DE UNA ZONA RURAL

N. Ramos Rodríguez^a, L. López-Marín^b, C.M. Martínez-Cara^c, J.M. Madeira Martins^d, A. Cabello Chanfreut^e, R.J. Reyes Vallejo^f, A. López Matarín^f, J. López Moreno^g, J. Cuevas Cruces^h y F. Leiva-Cepas^d

^aMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad de Gestión Clínica Palma del Río. Córdoba.

^bEnfermera. Universidad Católica de Valencia. Valencia. ^cEnfermera. Centro de Salud Roquetas Sur. Roquetas de

Mar. Almería. ^dMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad de Gestión Clínica Fuensanta.

Córdoba. ^eMédico de Familia; ^fMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad de Gestión Clínica

de Occidente. Consultorio de Villarrubia. Córdoba. ^gMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria.

Unidad de Gestión Clínica Aeropuerto. Córdoba.

Resumen

Objetivos: Comprobar si las gestantes se vacunan durante la gestación y conocer su motivación para ello. Identificar si las gestantes saben los beneficios e importancia de la vacuna antigripal (VAG) en la gestación. Valorar en qué medida los médicos de familia la conocen y aconsejan a las embarazadas dicha vacunación.

Metodología: Diseño: estudio observacional descriptivo. Emplazamiento: Consultorio rural. Población: mujeres gestantes mayores de 18 años que se encuentren embarazadas (N = 62) y médicos de familia que lleven el mismo (N = 8, 4 FEA de Medicina Familiar y Comunitaria y 4 Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria), durante el año 2015. Análisis descriptivo para variables cuantitativas y cualitativas (variables sociodemográficas, encuesta a médicos y embarazadas sobre beneficio de la VAG en embarazadas y consejo de la misma).

Resultados: N = 17. Edad media embarazadas 27,88 años (DT ± 4,25). Semana de gestación media de 21,10 (DT ± 11,20). El 33% tenían estudios universitarios. El primer embarazo en el 59% de las mujeres. El 93% no se ha vacunado nunca previamente sin estar embarazada, en otros embarazos el 5%. El 75% desconocen los beneficios de la VAG, el 60% no la solicitan (el 40% por desconocer sus beneficios y el 20% por no creer que sea necesaria). El 12% se vacunan. Edad media de los médicos 50,5 años (DT ± 13,24), 50% mujeres; respecto a los residentes: 29,5 años (DT ± 8,5) 25% mujeres. Media de años en el proceso de embarazo 3,17 (DT ± 2,53). El 89,9% conocen los beneficios de la VAG. La aconsejan el 73,57%, no creer que es necesario es la segunda causa de no prescripción, y el olvido en tercer lugar.

Conclusiones: La mayoría de las embarazadas no se vacunan, especialmente por el desconocimiento de los beneficios de su uso. A mayor nivel de educación, mejor es la adherencia. Respecto a los profesionales residentes y FEA conocen los beneficios; siendo el consejo de VAG mayor en médicos adjuntos.

Palabras clave: *Vacuna antigripal. Embarazo. Gripe.*