



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 212/808 - A VECES NO HACE FALTA MÁS QUE UN ERITEMA

A.M. Pozo Gallego<sup>a</sup>, A. San Martín Espinosa<sup>b</sup>, J.M. Gómez Aguinaga<sup>c</sup> y M. Moreno González<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Médico Residente; <sup>b</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Casa de Campo. Madrid. <sup>c</sup>Médico de Familia Adjunto. Servicio de Urgencias. Hospital Puerta de Hierro. Majadahonda.

### Resumen

**Descripción del caso:** Caso clínico que se desarrolla principalmente en el ámbito de atención primaria, con derivación posterior a consulta especializada. Se trata de un varón de 58 años con antecedente de fumador, hipertensión, EPOC que consultaba por múltiples placas eritemato-amarronadas de dos años de evolución a nivel de tórax y abdomen, de crecimiento lento, levemente pruriginosas. En un primer momento fue valorado por un dermatólogo en Francia sin determinar un diagnóstico definitivo.

**Exploración y pruebas complementarias:** En la exploración física se apreciaban placas eritemato-amarronadas con un tamaño de entre 3-12 cm de diámetro mayor, con borde neto e irregular. Se derivó a consultas de Dermatología de forma preferente; solicitando analítica completa, con total normalidad de los resultados y se realizaron varias biopsias de la piel, determinando el diagnóstico histológico. Se derivó a Medicina Interna para determinar si existía afectación sistémica, se realizó analítica, radiografía de tórax, TAC de tórax, ecocardiograma y gammagrafía, con resultados en el rango de la normalidad. Finalmente se determinó que sólo presentaba afectación cutánea.

**Juicio clínico:** Amiloidosis nodular.

**Diagnóstico diferencial:** Se debe descartar la amiloidosis sistémica. Otros procesos a tener en cuenta son: liquen simple crónico, prurigos simple y nodular, procesos granulomatosos como la sarcoidosis cutánea y el lupus vulgar, y especialmente el millium coloide o coloidosis en placa.

**Comentario final:** La amiloidosis es una enfermedad caracterizada por el depósito extracelular de amiloide en una o más localizaciones. La amiloidosis cutánea nodular primaria es la forma menos frecuente. La edad de inicio es a los 65 años aproximadamente, de predominio en varones. El curso de la enfermedad ha demostrado ser benigno, pero hay casos descritos que progresan a afectación sistémica. En este caso un síntoma olvidado durante años y rescatado durante la anamnesis fue clave.

### Bibliografía

1. Feito-Rodríguez J. García-Macarrón B. Pagán-Muñoz A, et al. Amiloidosis cutánea primaria localizada nodular con patrón diseminado. Actas Dermosifiliogr. 2008;99:648-52.

**Palabras clave:** *Eritema. Amiloidosis cutánea.*