



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

212/2742 - LUMBALGIA AGUDA: ¡OJO, NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE!

A. García Martínez^a, N. Otero Cabanillas^b, R. López Sánchez^c, A. Azagra Calero^d, I. Ruiz Larrañaga^e, S.F. Pini^f, J.J. Parra Jordán^g, V. Acosta Ramón^h, M. Tobalina Segura^f y E. Pariente Rodrigo^h

^aMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Camargo Interior. Cantabria. ^bMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Cantabria. ^cMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Dávila. Santander. ^dMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Sardinero. Cantabria. ^eMédico de Familia. Centro de Salud Camargo Costa. Maliaño. ^fMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud José Barros. Cantabria. ^gMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Cazoña. Cantabria. ^hMédico de Familia. Centro de Salud Camargo. Cantabria.

Resumen

Descripción del caso: Varón de 34 años sin antecedentes que consulta por cuadro de un mes de evolución de lumbalgia leve-moderada no irradiada, de perfil mecánico, cuyo inicio relaciona con un "tirón tras un salto". Exploración normal. Se inicia tratamiento analgésico/antiinflamatorio a demanda. A los 15 días acude a Urgencias refiriendo aumento progresivo de intensidad del dolor, ausencia de mejoría con analgesia que le impide dormir, irradiación por ambas extremidades inferiores y debilidad de las mismas que en los últimos días le dificulta la deambulaci3n. Ocasionalmente dificultad para la micci3n y defecaci3n e impotencia sexual. En las 3ltimas 48 horas, adormecimiento perineal e incontinencia urinaria.

Exploraci3n y pruebas complementarias: Constantes estables. Exploraci3n sist3mica: normal. Exploraci3n neurol3gica: alerta, consciente y orientado. Pares craneales: normales. Fuerza: extremidades superiores: conservada, extremidades inferiores: paraparesia global (IV/V), arreflexia y RCP bilateral indiferente. Sensibilidad: hipoestesia en hemiabdomen inferior, regi3n perineal, cara posterior muslos y lateral de piernas (III/V). Lassegue bilateral a < 30°. Análitica: hemograma, bioquímica y coagulaci3n: normales. RMN: tumoraci3n intrarraquidea en cono medular, desde vértebra T11 hasta L1. Estudio electroneurofisiol3gico: afectaci3n esfínter anal bilateral (S3-S4), M. gastrocnemio bilateral (S1-S2) y M. extensor largo del dedo gordo bilateral (L5-S1).

Juicio clínic3: Síndrome del cono medular/cauda equina secundario a tumor intramedular

Diagn3stico diferencial: Fractura vertebral, hernia discal, enfermedad infecciosa/inflamatoria medular.

Comentario final: El dolor lumbar es un problema de salud importante. Su prevalencia se sitúa alrededor del 80%. Generalmente benigno y autolimitado, debido a causas inespecíficas-musculoesqueléticas, pero un pequeño porcentaje se debe a procesos sistémicos graves, por ello es importante indagar y detectar precozmente la presencia de signos de alarma (edad inicio, fiebre,

síndrome general, antecedentes de cáncer u osteoporosis, déficit neurológico, dolor inflamatorio). La presencia de cualquiera de ellos es indicación de RMN urgente. El síndrome de cono medular/cauda equina puede deberse a múltiples causas: fracturas, hernias, espondilosis, estenosis del canal, tumores, infecciones/inflamación... Dentro de los tumores intramedulares podemos distinguir entre primarios: gliomas (ependimomas, astrocitomas, oligodendrogliomas) y secundarios: metastásicos. El tratamiento de ambos es la resección quirúrgica precoz ± radioterapia posterior y su pronóstico es variable (según tipo y grado). Nuestro paciente ingresó en Neurocirugía para exéresis tumoral (sin incidencias). Durante su estancia postoperatoria sufrió un episodio de alteración del nivel de conciencia (agitación psicomotriz y desorientación) con crisis comicial parcial motora posterior. En TC: múltiples lesiones ocupantes de espacio sugestivas de metástasis con sangrado de una de ellas, compresión del sistema ventricular e hidrocefalia secundaria con signos de HTIC. Ante las complicaciones descritas, el paciente falleció a las pocas horas.

Bibliografía

1. Valle Calvet M, Olivé Marqués A. Signos de alarma de la lumbalgia. *Semin Fund Esp Reumatol*. 2010;11:24-7.
2. Yusta Izquierdo A, Andrés del Barrio MT, Alavena Brou M. Mielopatías. *Medicine*. 2011;10:5191-9.

Palabras clave: *Síndrome cauda equina. Tumor intramedular.*