



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 212/533 - FACTORES DE RIESGO Y CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-DEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES CON NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD EN UN CENTRO DE SALUD URBANO

M.R. Naharro Franco<sup>a</sup>, M.V. Polo Ruiz<sup>b</sup>, M.I. Luna Moreno<sup>c</sup>, L. Ruíz del Moral<sup>c</sup>, Á.M. Gutiérrez García<sup>b</sup> y A.E. Hormigo Pozo<sup>d</sup>

<sup>a</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Alhaurín Grande. Málaga. <sup>b</sup>Médico Residente; <sup>d</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Puerta Blanca. Málaga. <sup>c</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ciudad Jardín. Málaga.

### Resumen

**Objetivos:** Valorar los factores de riesgo y el nivel de vacunación indicada en los pacientes diagnosticados de neumonía adquirida en la comunidad.

**Metodología:** Estudio retrospectivo, realizado en Atención Primaria. Extracción mediante listado de historia digital de todos los pacientes diagnosticados de neumonía adquirida en la comunidad en el último año. Para variables cuantitativas analizamos medias, desviación estándar e intervalo de confianza. Para cualitativas medidas de frecuencia y proporción.

**Resultados:** La población del centro analizada es 15.165 mayores de 18 años. Diagnóstico de neumonía 133 pacientes (70 mujeres y 63 hombres y dos fallecidos) incidencia de 0,0087 total y 14,7 casos por cupo/año, edad media de 45,37 años de los cuales el 52,63% mujeres. De los factores de riesgo: sin factores 85, EPOC/asma 20, insuficiencia cardíaca 5, diabetes 11. Vacunados gripe 22,55% (indicación vacuna 39,84%) y neumococo 0,75% (indicación vacuna 42,89%).

**Conclusiones:** La edad de aparición es en edades jóvenes. La gran mayoría no presentan factores de riesgo predisponentes. La administración de vacunaciones de gripe y sobre todo neumococo presenta un amplio margen de mejora.

**Palabras clave:** Neumonía. Factores riesgo. Vacunación. Neumococo. Gripe.