



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 212/3233 - Dolor abdominal, un síntoma del cual no es bueno fiarse...

E.M. Cama Meza<sup>a</sup>, V.A. Saviola<sup>b</sup>, P.Á. Oriol Torón<sup>c</sup>, T. Badia Farré<sup>c</sup>, S. Miravet Jiménez<sup>d</sup> y J.L. Tandaiapan Jaime<sup>d</sup>

<sup>a</sup>Médico de Familia. ABS Pallejà. Barcelona. <sup>b</sup>Médico de Familia. CAP Martorell. Barcelona. <sup>c</sup>Médico de Familia. EAP Martorell Urbà. Barcelona. <sup>d</sup>Médico de Familia. ABS Martorell. Barcelona.

## Resumen

**Descripción del caso:** Mujer de 52 años acude a urgencias del CAP porque hoy al despertarse presenta dolor en epigastrio tipo pesadez que posteriormente se irradia a hipocondrio y fosa iliaca derecha no presencia de fiebre, no molestias urinarias, no presencia de deposiciones líquidas No refiere antecedentes traumáticos ni de sobrecarga. AP: no AMC, fumadora de 10 cigarrillos diarios.

**Exploración y pruebas complementarias:** Consciente orientada, bien hidratada, buena coloración en piel y mucosas, SatO<sub>2</sub>: 98%. TA: 110/72 mmHg. FC: 75 × min. AR: normal, ACV: normal; Abdomen: blando no doloroso a la palpación superficial, no visceromegalia, sin irritación peritoneal. Exámenes complementarios: hemoglobina 14,4 g/dL, Hto 42,4%, leucocitos 13,52 × 10<sup>9</sup>/L (N: 89%, Linf: 7% M: 2%, Eo: 0%). Plaquetas 247 × 10<sup>9</sup>/L, bioquímica normal, hepático normal. PCR 24,07 mg/L Rx de tórax: dentro de la normalidad Rx de abdomen: Aerocolia sin imagen de neumoperitoneo, no niveles hidroaéreos, no signos de oclusión. Ecografía: dentro de la normalidad. Tratamiento: Motilium cada 8 horas y si persistía el dolor acudir al hospital de referencia.

**Juicio clínico:** La presencia del dolor abdominal en FID y la clínica es sugestiva de apendicitis y evitar complicación.

**Diagnóstico diferencial:** Se ha de realizar con salpingitis aguda, perforación ulcus duodenal, isquemia intestinal, torsión ovárica, divertículo de Meckel, infarto del epiplón mayor.

**Comentario final:** La apendicitis es una entidad urgente, la anamnesis y exploración física es fundamental y nos obliga a iniciar la derivación para cirugía. En los últimos años ha ocurrido un descenso de la mortalidad asociada a la apendicitis aguda (26,0 a menos del 1,0%). Pero, la morbilidad presenta una alta incidencia de perforaciones (17,0 al 20,0%). La incidencia de apendicitis aguda en el adulto mayor fue de 4,7% y a medida que aumenta la edad es dolor atípico.

## Bibliografía

1. Adefna Pérez RI, Leal Mursulí A, Castellanos González JA, et al. Rev Cubana Cir. 2011;50(3).
2. Shelton T, McKinlay R, Swchwatz RW. Acute appendicitis: Current diagnosis and treatment. Current Surgery. 2003;60:502-5.
3. Zinner MJ, Ashley SW. Chapter 21. Appendix and Appendectomy, Maingot's Abdominal Operations. USA: The McGraw-Hill's Companies, Access surgery; 2007.

**Palabras clave:** *Dolor abdominal. Apendicitis. Tratamiento.*