



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

212/3016 - ¡Qué mal me huele esto!

C.J. Pascual Suaza<sup>a</sup>, A.M. Rivas Román<sup>a</sup> y R. Orta Chino<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Médico de Familia. Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias. Cádiz. <sup>b</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Casines. Cádiz.

## Resumen

**Descripción del caso:** Paciente de 52 años, diagnosticado de DM1, que no responde a la llamada en su domicilio estando en interior, al ser llamado por salida de aguas fecales a través de su puerta y que es encontrado en decúbito supino en el suelo de su domicilio desorientado, balbuceando y rodeado de restos de basura.

**Exploración y pruebas complementarias:** MEG, taquipneico. Glasgow 9/15. ACP: tonos rítmicos y puros. MVC. Abdomen globuloso, blando y depresible. EEII: sin edemas ni datos de TVP. T.A. 74/48 mmHg, FC 105 lpm. T<sup>a</sup> 38,2 °C. Leucocitosis con neutrofilia en hemograma, bioquímica destaca glucosa 608, creatinina 3,3, PCR 32 y PCT 298. En coagulación act. protrombina 58% y fibrinógeno 989. pH 7,24. Se extrajo hemo y urocultivo.

**Juicio clínico:** Bacteriemia por *E. coli* BLEE identificada en hemocultivo y urocultivo.

**Diagnóstico diferencial:** ACVA, crisis comicial, ingesta medicamentosa, TCE, encefalopatía metabólicas, cuadros inflamatorios sistémicos.

**Comentario final:** El paciente fue ingresado en la UCI, donde precisó de vasoactivos, hemodiálisis y fue intubado por desaturación con Ventimax. Se pautó linezolid al detectar *E. coli*. Psiquiatría valoró al paciente diagnosticándolo de trastorno de personalidad con reacción adaptativa ansioso-depresiva. Tras ingreso durante una semana en UCI y 10 días en planta, fue dado de alta con hemocultivo de control negativo.

## Bibliografía

1. Prevalence and epidemiology of microbial pathogens causing bloodstream infections: Results of the OASIS multicenter study. *Diag Microbiol Infect Dis*. 2011;69:363-9.
2. Bloodstream infections caused by antibiotic-resistant gram-negative bacilli: Risk factors for mortality and impact of inappropriate initial antimicrobial therapy on outcome. *Antimicrob Agents Chemother*. 2005;49:760-6.

**Palabras clave:** Bacteriemia. *E. coli*. Resistencias betalactamasas.